

叶兴阳

双语音标有声读物

叶兴阳
英语教育创始人
双音阅读教育创始人

中国英语教育界领军人物
英语教育界领军人物
英语教育界领军人物

双语音标 阅读创始人

注音阅 读英语 教育之父

中国英语教育界领军人物
英语教育界领军人物
英语教育界领军人物

叶兴阳

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，从事英语教学工作多年，具有丰富的教学经验和深厚的学术造诣。

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：叶兴阳

内容来源：公共领域英文原著

适用对象：英语学习者、教师、研究者

版本日期：2025 年

目录

共 1 个章节

1. 内布拉斯加州部分哺乳动物的分布(distribution Of Some Nebraskan Mammals) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

内布拉斯加州部分哺乳动物的分布(Distribution of Some Nebraskan Mammals)

第1/1页

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv][ˈkænzəs] [ˌprbliˈkeɪʃnz]
University of Kansas Publications
大学 的 堪萨斯州 出版物

堪萨斯大学出版社

[mjuˈzi:əm][ʌv; əv][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
Museum of Natural History
博物馆 的 自然的 历史

自然历史博物馆

[ˈvɑːljəm] [ˈsevnən] , [noʊ] . [sɪks] , [piːˈpiː] . - - -
Volume 7 , No 6 , pp 479 - 487
体积 7 , 不 . 6 , pp . - - -

第7卷，第6期，第479-487页

[ˈeɪprəl] - , -
April 21 , 1954
四月 - , -

1954年4月21日

[ˌdɪstrɪˈbjʊːʃ(ə)n][ʌv; əv][sʌm; səm][nəˈbræskən; ni-] [ˈmæm(ə)lz]
Distribution of Some Nebraskan Mammals
分配 的 一些 内布拉斯加州 哺乳动物

内布拉斯加州部分哺乳动物的分布

[baɪ]
BY
经过

经过

[dʒeɪ] . [nɑːks] [dʒəʊnz] , [ˈdʒʊnjə] .
J . KNOX JONES , JR :
J . 诺克斯 琼斯 , JR .

J. KNOX JONES, JR.

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv][ˈkænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

Lawrence1954
Lawrence1954
Lawrence1954

劳伦斯1954

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv][ˈkænzəs] [ˌprbliˈkeɪʃnz] , [mjuˈzi:əm][ʌv; əv][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
University of Kansas Publications , Museum of Natural History
大学 的 堪萨斯州 出版物 , 博物馆 的 自然的 历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

[ˈeditəz] : [iː] . [ˈreɪmənd] [hɔːl] , [ˈtʃermən] , [ə; eɪ] . [ˈbaɪrən] [ˈlenərd] , [ˈrɑːbərt][ˈdʌbljuː] . [ˈwɪlsn]
Editors : E . Raymond Hall , Chairman , A . Byron Leonard , Robert W . Wilson
编辑 : E . 雷蒙德 大厅 , 主席 , 一个 : 拜伦 伦纳德 , 罗伯特 W : 威尔逊

编辑：E·雷蒙德·霍尔（主席）、A·拜伦·伦纳德、罗伯特·W·威尔逊

[ˈvɑːljəm] [ˈsevən] , [noʊ] . [sɪks] , [piːˈpiː] . - - - -
Volume 7 , No 6 , pp 479 - 487
体积 7 , 不 6 , pp - - -

第7卷，第6期，第479-487页

[ˈpʌblɪʃt] [ˈeɪprəl] - , -
Published April 21 , 1954
已发布 四月 - , -

发表于1954年4月21日

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv][ˈkænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

[ˈlɔːrəns] , [ˈkænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州

堪萨斯州劳伦斯

[ˈprɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过

印刷者

[ˈfɜːd] [vɔɪlənd] , [ˈdʒʊnjɜː] . , [stɛrt] [ˈprɪntər]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机

FERD VOILAND, JR., 国家印刷商

[təˈpiːkə] , KANSAS195425 - -
TOPEKA , KANSAS195425 - 2530
托皮卡 , KANSAS195425 - -

堪萨斯州托皮卡 195425-2530

[,piː ˈdʒiː] - -]
[**Pg 481**]
[页 -]

[第481页]

[ˌdɪstrɪˈbjʊːʃ(ə)n][ʌv; əv][sʌm; səm][nəˈbræskən; ni-] [ˈmæm(ə)lɜː]
Distribution of Some Nebraskan Mammals
分配 的 一些 内布拉斯加州 哺乳动物

内布拉斯加州部分哺乳动物的分布

[baɪ]
by
经过

经过

[dʒeɪ] . [nɑːks][dʒəʊnz] , [ˈdʒʊnjɜː] .
J . Knox Jones , Jr .
J . 诺克斯 琼斯 , 小 .

J. Knox Jones, Jr.

[brɪˈkæz, brɪˈkɔːz] [ˈmɪləteri] [ˈsɜːrvɪs] [wɪl] [ˌɪntəˈrʌpt] [maɪ] [ˈstʌdi] [ʌv; əv][nəˈbræskən; ni-] [ˈmæm(ə)lɜː] ,
Because military service will interrupt my study of Nebraskan mammals ,
因为 军队 服务 将要 打断 我的 学习 的 内布拉斯加州 哺乳动物 ,

因为服兵役会中断我对内布拉斯加州哺乳动物的研究，

[aɪ][,er 'em] [hɪr] ['pleɪsɪŋ] [ɑ:n][ˈrekɔ:d; rɪˈkɔ:d][ˈsɜ:rt(ə)n][,ɪnfərˈmeɪ(ə)n][ɑ:n][ðə; ði] [ˌdʒi:əˈgræfɪk] [ˌdɪstrɪˈbjʊ:(ə)n]
I am here placing on record certain information on the geographic distribution
我是这里 放置 在 记录 肯定 信息 在这 地理 分配
[ʌv; əv] ['sevrəl] ['spi:ʃi:z] — [,ɪnfərˈmeɪ(ə)n] [ðæt] [ɪz] [θɔ:t] ['pɜ:rt(ə)nənt][tu:; tə] ['kɜ:rənt] ['stʌdiz] [ʌv; əv]
of several species — information that is thought pertinent to current studies of
的 一些 物种 — 信息 那是 想法 相关 到 当前的 研究 的
[sʌm; səm][ʌv; əv][maɪ][əˈsoʊsierts; əˈsoʊfierts] .
some of my associates :
一些 的 我的 同事 :

我在此记录一些关于几种物种地理分布的信息——这些信息被认为与我的一些同事目前的研究有关。

[moʊst][ʌv; əv] [ðɪs] [,ɪnfərˈmeɪ(ə)n][ɪz][prəˈvaɪdɪd][baɪ] ['spesimənz] ['ri:s(ə)ntli] [kəˈlektɪd] [baɪ][,em 'i:][ænd; ənd]
Most of this information is provided by specimens recently collected by me and
最多的 的 这 信息 是 假如 经过 标本 最近 集 经过 我 和
[ˈʌðər] [reprɪˈzentətɪv] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌju:nɪˈvɜ:rsəti][ʌv; əv][ˈkænzəs][ˌmjuˈzi:əm][ʌv; əv][ˈnæt(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
other representatives of the University of Kansas Museum of Natural History
其他 代表 的 这 大学 的 堪萨斯州 博物馆 的 自然的 历史
,
,
,

这些信息大部分来自我和堪萨斯大学自然历史博物馆其他代表近期收集的标本。

[ɔ:lˈðoʊ] ['spesimənz] [frʌm; frəm] [ˈʌðər] [kəˈlekʃənz] [prəˈvaɪd][sʌm; səm][ʌv; əv][ðə; ði]ˈrekərdz] [ˌhɪrˈɪn]
although specimens from other collections provide some of the records herein
虽然 标本 从 其他 收藏 提供 一些 的 这 记录 在此处
[rɪˈpɔ:rtɪd] .
reported .
据报道 :

尽管本文所报告的部分记录来自其他收藏的标本。

[ðə; ði] [ˈʌðər] [kəˈlekʃənz] [ɑ:r; ər][ðə; ði][ˌbaɪəˈlɑ:dʒɪk(ə)][sɜːˈveɪz, ˈsɜːˌveɪz] [kəˈlekʃ(ə)n] [ʌv; əv][ðə; ði][ˌjuˈnartɪd]
The other collections are the Biological Surveys Collection of the United
这 其他 收藏 是 这 生物 调查 收藏 的 这 团结的
[steɪts] [ˈnæʃ(ə)nəl][ˌmjuˈzi:əm] ([ˈjuːˌɛsˈbi:z]) ,
States National Museum (USBs) ,
各州 国家的 博物馆 (USB接口) ,
其他藏品包括美国国家博物馆生物调查藏品（USBS），

[ðə; ði] [ˈheɪstɪŋz] [ˌmjuˈzi:əm] ([ˌeɪtʃ ˈem]) , [ðə; ði] [nəˈbræskə] [geɪm] , [ˌfɑ:rɪsˈteɪʃən] [ænd; ənd][ˈpɑ:rkz]
the Hastings Museum (HM) , the Nebraska Game , Forestation and Parks
这 黑斯廷斯 博物馆 (HM) , 这 内布拉斯加州 游戏 , 造林 和 公园
[kəˈmɪʃ(ə)n] (-) ,
Commission (NGFPC) ,
委员会 (-) ,
黑斯廷斯博物馆（HM）、内布拉斯加州狩猎、林业和公园委员会（NGFPC）

[ðə; ði][ˌju:nɪˈvɜ:rsəti][ʌv; əv][ˌkæləˈfɔ:rnɪə][ˌmjuˈzi:əm][ʌv; əv] [ˈvɜ:rtɪbrət] [zuˈɑ:lədʒi] ([ɛmvi:z]) ,
the University of California Museum of Vertebrate Zoology (MVZ) ,
这 大学 的 加利福尼亚州 博物馆 的 脊椎动物 动物学 (MVZ) ,
加州大学脊椎动物学博物馆（MVZ）

[ðə; ði][ˌju:nɪˈvɜ:rsəti][ʌv; əv] [ˈmɪʃɪɡən] [ˌmjuˈzi:əm][ʌv; əv][zuˈɑ:lədʒi] ([ɛmˈzi:]) [ænd; ənd][ðə; ði][ˌju:nɪˈvɜ:rsəti]
the University of Michigan Museum of Zoology (MZ) and the University
这 大学 的 密歇根州 博物馆 的 动物学 (MZ) 和 这 大学
[ʌv; əv] [nəˈbræskə] [steɪt] [ˌmjuˈzi:əm] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) .
of Nebraska State Museum (NSM) .
的 内布拉斯加州 状态 博物馆 (国家安全机制) .
密歇根大学动物学博物馆（MZ）和内布拉斯加州立博物馆（NSM）。

[ˈɡreɪtf(ə)] [əkˈnɑːlɪdʒmənt] [hɪrˈbaɪ] [ɪz] [meɪd] [tuː; tə] [ˈpəːsənz] [ɪn] [tʃɑːrdʒ] [ʌv; əv] [ðiːz] [ˈsevrəl]
Grateful acknowledgment hereby is made to persons in charge of these several
感激的 致谢 特此 是 制成 到 人 在 收费 的 这些 一些
[kəˈlɛkʃənz] [fɔːr; fər] [ˈlendɪŋ] [ðə; ði] [məˈtɪriəlz] [kənˈsɜːrnd] .
collections for lending the materials concerned .
收藏 为了 贷款 这 材料 担心的 .

在此，谨向负责这些藏品的各位人士致以衷心的感谢，感谢他们借出相关资料。

[ˈspesimənz] [ˈmenʃ(ə)nd] [ɪn] [ðə; ði] [ˈfɑːloʊɪŋ] [əˈkaʊnts] [ɑːr; ər] [ɪn] [ðə; ði] [ˌjuːnɪˈvɜːrsəti] [ʌv; əv] [ˈkænzəs]
Specimens mentioned in the following accounts are in the University of Kansas
标本 提及 在 这 下列的 账户 是 在 这 大学 的 堪萨斯州
[mjuːziːəm] [ʌv; əv] [ˈnætʃ(ə)rəl] [ˈhɪstri; ˈhɪstəri] ,
Museum of Natural History ,
博物馆 的 自然的 历史 ,

以下描述中提到的标本均收藏于堪萨斯大学自然历史博物馆。

[ɪkˈsept] [æz; əz] [ˈʌðərwaɪz] [ˈsteɪtɪd] .
except as otherwise stated .
除了 作为 否则 声明 .

除非另有规定。

[ɔːl] [ˈmezərmənts] [ɑːr; ər] [ɪn] [ˈmɪlimiːtəz] .
All measurements are in millimeters .
全部 测量 是 在 毫米 .

所有尺寸单位均为毫米。

[ˈkʌlər] [tɜːrmz] [ɑːr; ər] [ðoʊʊz] [ʌv; əv] [ˈrɪdʒ,weɪ] (-) .
Color terms are those of Ridgway (1912) .
颜色 条款 是 那些 的 里奇韦 (-) .

颜色术语采用 Ridgway (1912) 的术语。

[ə; eɪ] [pɑːrt] [ʌv; əv] [ðə; ði] [fʌndz] [fɔːr; fər] [fiːld] [wɜːrk] [wʌz; wəz] [meɪd] [əˈveɪləb(ə)] [baɪ] [ðə; ði] [ˈnæʃ(ə)nəl]
A part of the funds for field work was made available by the National
一个 部分 的 这 资金 为了 场地 工作 曾是 制成 可用的 经过 这 国家的
[ˈsaɪəns] [faʊnˈdeɪʃ(ə)n] [ænd; ənd] [ðə; ði] [ˈkænzəs] [ˌjuːnɪˈvɜːrsəti] [ɪnˈdaʊmənt] [ə,səʊsiˈeɪʃn; ə,səʊʃiˈeɪʃn] .
Science Foundation and the Kansas University Endowment Association .
科学 基础 和 这 堪萨斯州 大学 捐赠基金 协会 .

部分实地考察资金由国家科学基金会和堪萨斯大学捐赠协会提供。

[ˈsɔːrɛks] [sɪˈniːriəs] - .
Sorex cinereus haydeni .
索雷克斯 灰岩 - .

Sorex cinereus haydeni.

([ˈbɛrd]) .
(**Baird**) .
(贝尔德) .

(贝尔德)

[siˈniəriəs] [ʃruː] . — [tuː] [meɪl] [ʃruː] [wɜːr; wər] [træpt] [ɑːn] [ˈeɪprəl] [ˈsɛvən] , - , [əˈmʌŋ] [ˈrɑːks]
Cinereous Shrew . — **Two male shrews were trapped on April 7 , 1952 , among rocks**
灰炆 泼妇 . — 二 男性 鼯鼯 是 被困 在 四月 7 , - , 之中 岩石
[əˈbːŋ] [æn; ən] [oʊld] [ˈreɪlroʊd] [fɪl] ,
along an old railroad fill ,
沿着 一个 老的 铁路 充满 ,

灰背鼯——1952年4月7日，两只雄性灰背鼯在一条废弃铁路填土的岩石间被捕获。

[fɔːr] [miː] . [en] ,
[4] [miː] . [n] ,
[4] 米 . [n] ,

北面 4 英里，

[wʌn] / [tu:'tu:][mi:] . [i:][ʌv; əv][ɑ:k'terivə] , ['bʌtlər] ['kaʊnti] ,
1 / 2 mi . E of Octavia , Butler County ,
1 / 2 米 . E 的 奥克塔维娅 , 巴特勒 县 ,
位于巴特勒县奥克塔维娅以东 1/2 英里处

[ðʌs] [ɪk'stendɪŋ] [ðə; ði] [noʊn] [ˌdʒi:ə'græfɪk][reɪndʒi][ʌv; əv][es] . [si:] . - [ə'prɑ:ksɪmətli] - [maɪlz]
thus extending the known geographic range of S . c . haydeni approximately 60 miles
因此 扩展 这 已知 地理 范围 的 S . c . - 大约 - 英里
[ˈsaʊθwərd] [frʌm; frəm][ə; eɪ][laɪn] [kə'nektɪŋ] [pɜ:rtɪ] ,
southward from a line connecting Perch ,
向南 从 一个 线 连接 栖息 ,
因此, S. c. haydeni 的已知地理范围从连接 Perch 的线向南延伸了大约 60 英里。

[rɑ:k] ['kaʊnti] , [nə'bræskə] , [wɪð; wɪθ] [wɔ:l] [leɪk] , [sæk] ['kaʊnti] , ['aɪər] ([si:] ['dʒæksən] , - : - -
Rock County , Nebraska , with Wall Lake , Sac County , Iowa (see Jackson , 1928 : 52 -
岩石 县 , 内布拉斯加州 , 和 墙 湖 , 萨克 县 , 爱荷华州 (看 杰克逊 , - : - -
-) ,
53) ,
-) ,
内布拉斯加州罗克县, 以及爱荷华州萨克县沃尔湖 (参见 Jackson, 1928: 52-53) ,

[ænd; ənd] [prə'vaɪdɪŋ] [ðə; ði][fɜ:rstɪ]'rekɔ:d; rɪ'kɔ:d][ʌv; əv] [ə'kɜ:rəns] [ɪn][ðə; ði] [plæt] ['rɪvər] ['væli] .
and providing the first record of occurrence in the Platte River Valley .
和 提供 这 第一的 记录 的 发生 在 这 普拉特 河 谷 .
并首次记录了该物种在普拉特河谷的出现。

[tu:] [ə'dɪfən(ə)l] ['spesɪmənz] , ['teɪkən][ɑ:n][dʒʊ'laɪ] - , - , [ɑ:r; ər][frʌm; frəm][tu:'tu:] - [wʌn] / [tu:'tu:]
Two additional specimens , taken on July 17 , 1952 , are from 2 - 1 / 2
二 额外的 标本 , 已采取 在 七月 - , - , 是 从 2 - 1 / 2
[mi:] . [en][ʌv; əv] ['ɔrd] ,
mi . N of Ord ,
米 . N 的 奥德 ,
另外两个标本于 1952 年 7 月 17 日采集, 地点位于 Ord 以北 2.5 英里处。

['væli] ['kaʊnti] , [ə'ɒ:ŋ] [ðə; ði] [laʊp] ['rɪvər] , [ə; eɪ] ['trɪbjətəri] [ʌv; əv][ðə; ði] [plæt] [frʌm; frəm][ðə; ði] [nɔ:rθ]
Valley County , along the Loup River , a tributary of the Platte from the north
谷 县 , 沿着 这 狼 河 , 一个 支流 的 这 普拉特 从 这 北
.
:
.
山谷县, 位于卢普河沿岸, 卢普河是普拉特河从北部流出的支流。

[blə'reɪnə] [ˌbrɛvɪ'kɔ:də] [ˌkærəli'nɛnsɪs] (['bɑ:kməŋ]) .
Blarina brevicauda carolinensis (Bachman) .
布拉里纳 短尾 卡罗莱纳 (巴赫曼) .
Blarina brevicauda carolinensis (Bachman).

[ʃɔ:rt] - [teɪld] [fru:] . — [dʒeɪ] . [es] . ['fɪndli] [ænd; ənd][aɪ] , [ɪn][ə; eɪ] [ˌfɔ:rθ'kʌmɪŋ] ['peɪpər] ,
Short - tailed Shrew . — J . S . Findley and I , in a forthcoming paper ,
短的 - 有尾巴的 泼妇 . — J . S . 芬德利 和 我 , 在 一个 即将推出 纸 ,
短尾鼯䟽——JS Findley 和我, 在即将发表的论文中,

[rɪ'vjʊ:] [ðə; ði][ˌdɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n][ʌv; əv][blə'reɪnə] [ˌbrɛvɪ'kɔ:də] [ɪn][ðə; ði] [greɪt] [pleɪnz] ['ri:dʒən] ,
review the distribution of Blarina brevicauda in the Great Plains region ,
审查 这 分配 的 布拉里纳 短尾 在 这 伟大的 平原 地区 ,
调查短尾鼯在大平原地区的分布情况,

[rɪ'kɔ:rdɪŋ] [bi:] . [bi:] . [ˌkærəli'nɛnsɪs][frʌm; frəm][ðə; ði] [ɪk'stri:m] [ˌsaʊθ'i:stərn] [ænd; ənd] [ˌsaʊθ'westərn]
recording B . b . carolinensis from the extreme southeastern and southwestern
记录 B . b . 卡罗莱纳 从 这 极端 东南部 和 西南
记录到来自极东南和西南地区的卡罗莱纳伯克霍尔德氏菌 (B. b. carolinensis)。

[ˈkauntɪz] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] .
counties of Nebraska .
县 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的各县。

[ə; eɪ] [ˈsɪriːz] [ʌv; əv] [faɪv] [ˈruː] [ʌv; əv] [ðɪs] [ˈspiːʃiːz] [ˈriːs(ə)ntli] [əbˈteɪnd] [frʌm; frəm] [θriː] [maɪlz] [saʊθ]
A series of five shrews of this species recently obtained from three miles south
一个 系列 的 五 鼯鼯 的 这 物种 最近 获得 从 三 英里 南
[ænd; ənd] [tuː] [maɪlz] [iːst] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] [ˈsɪti] [ɪn] [ˈoʊtoʊiː] [ˈkaʊnti] ,
and two miles east of Nebraska City in Otoe County ,
和 二 英里 东方 的 内布拉斯加州 城市 在 奥托 县 ,
最近在内布拉斯加城以南三英里、以东两英里的奥托县发现了五只该物种的鼯鼯。

[ˈævərɪdʒ] [sɪɡˈnɪfɪkəntli] [ˈsmɔːlər] [ɪn] [bəʊθ] [ðə; ði] [ˈkreɪniəl] [ænd; ənd] [ðə; ði] [ɪkˈstɜːrn(ə)l] [ˈmezərmənts]
average significantly smaller in both the cranial and the external measurements
平均的 显著地 较小的 在 两个都 这 颅骨 和 这 外部的 测量
[ðæn; ðən] [ˈtɪpɪk(ə)] [biː] . [biː] . [ˌbrɛvɪˈkɔːdə] [ænd; ənd] [fɔːl] [wel] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [reɪndʒ] [ʌv; əv] [ˌkærəliˈnɛnsɪs] .
than typical B . b . brevicauda and fall well within the range of carolinensis .
比 典型的 B . b . 短尾 和 落下 出色地 之内 这 范围 的 卡罗莱纳 .
平均而言，无论是颅骨还是外部测量值都明显小于典型的 B. b. brevicauda，并且完全在 carolinensis 的范围内。

[ˈævərɪdʒ] [ænd; ənd] [ɪkˈstriːm] [ɪkˈstɜːrn(ə)l] [ˈmezərmənts] [ʌv; əv] [ðə; ði] [fɔːr] [əˈdʌlts] [frʌm; frəm] [ˈoʊtoʊiː]
Average and extreme external measurements of the four adults from Otoe
平均的 和 极端 外部的 测量 的 这 四 成年人 从 奥托
[ˈkaʊnti] , [θriː] [ˈmeɪlz] [ænd; ənd] [wʌn] [ˈfiːmeɪl] ,
County , three males and one female ,
县 , 三 男性 和 一 女性 ,
来自奥托县的四名成年人（三名男性和一名女性）的平均和极端外部测量数据，

[ɑːr; ər] [æz; əz] [ˈfaːləʊz] : [ˈtoʊt(ə)] [lɛŋkθ; lɛŋθ] , - (- - -) ; [lɛŋkθ; lɛŋθ] [ʌv; əv] [teɪl] - [ˈvɜːrtɪbrə] ,
are as follows : Total length , 110 (109 - 112) ; length of tail - vertebrae ,
是 作为 跟随 : 全部的 长度 , - (- - -) ; 长度 的 尾巴 - 椎骨 ,
- . [tuːˈtuː] (- - -) ; [lɛŋkθ; lɛŋθ] [ʌv; əv] [haɪnd] [fʊt] , - . [ɛrt] (- - -) .
24 . 2 (22 - 26) ; length of hind foot , 13 . 8 (13 - 14) .
- . 2 (- - -) ; 长度 的 后 脚 , - . 8 (- - -) .

具体如下：总长度，110（109-112）；尾椎长度，24.2（22-26）；后足长度，13.8（13-14）。

[əˈnʌðər] [ˈspesɪmən] [frʌm; frəm] [θriː] [miː] . [es] , [wʌn] - [wʌn] / [tuːˈtuː] [miː] . [iː] [ʌv; əv] [pəˈruː] , [ˈnɛməˌhɑː]
Another specimen from 3 mi . S , 1 - 1 / 2 mi . E of Peru , Nemaha
其他 标本 从 3 米 . S , 1 - 1 / 2 米 . E 的 秘鲁 , 内马哈
[ˈkaʊnti] ,
County ,
县 ,
另一件标本来自内马哈县秘鲁以南 3 英里、以东 1.5 英里处。

[ˈɔːlsʊʃ] [ɪz] [rɪˈfɜːrəbl̩ˈrefrəbl̩] [tuː; tə] [ˌkærəliˈnɛnsɪs] .
also is referable to carolinensis .
还 是 可参考的 到 卡罗莱纳 .

也可指卡罗莱纳人。

[ðɪːz] [ˈriːs(ə)nt] [ˈrekərdz] [ˈɪndɪkeɪt] [ðæt] [ðə; ði] [reɪndʒ] [ʌv; əv] [biː] . [biː] . [ˌkærəliˈnɛnsɪs] [ɪkˈstendz; ekˈstendz]
These recent records indicate that the range of B . b . carolinensis extends
这些 最近的 记录 表明 那 这 范围 的 B . b . 卡罗莱纳 扩展
[ʌp] [ðə; ði] [mɪˈzʊəri] [ˈrɪvər] [ˈvæli] ,
up the Missouri River Valley ,
向上 这 密苏里州 河 谷 ,
这些最新记录表明，卡罗来纳熊蜂（B. b. carolinensis）的分布范围向上游延伸至密苏里河谷。

[əˈprɑːksɪmətli] [tuː; tə] [nəˈbræskə] ['sɪti] , ['oʊtoʊiː] ['kaʊnti] .
approximately to Nebraska City, Otoe County .
大约 到 内布拉斯加州 城市 , 奥托 县 .

大约到内布拉斯加城，奥托县。

[faɪv] ['spesɪmənz] [frʌm; frəm] ['luːɪvɪl] , [kæs] ['kaʊnti] , [ðə; ði][nekst] ['kaʊnti] ['nɔːrθwərd] , [əˈlɔːŋ] [ðə; ði]
Five specimens from Louisville, Cass County, the next county northward, along the
五 标本 从 路易斯维尔 , 卡斯 县 , 这 下一个 县 向北 , 沿着 这
[ˈrɪvər] ,
River ,
河 ,

来自路易斯维尔、卡斯县（沿河向北的下一个县）的五个标本：

[ɑːr; ər][rɪˈfɜːrəbl,'refrəbl][tuː; tə][biː] . [biː] . [brɛvɪ'kɔːdə] .
are referable to B. b. brevicauda .
是 可参考的 到 B . b . 短尾 .

可归类为 B. b. brevicauda。

[ɛpˈtɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['fʌskəs] .
Eptesicus fuscus fuscus .
eptesicus 褐藻 褐藻 .

Eptesicus fuscus fuscus.

([boʊˈvwaː]) .
(**Beauvois**) .
(博瓦) .

（博瓦）

[bɪɡ] [braʊn] [bæt] . — [wʌn] [bɪɡ] [braʊn] [bæt][wʌz; wəz] [əbˈteɪnd] [ɑːn][dʒʊˈlaɪ] - , - ,
Big Brown Bat. — One big brown bat was obtained on July 23, 1952,
大的 棕色的 蝙蝠 . — 一 大的 棕色的 蝙蝠 曾是 获得 在 七月 - , - ,

大棕蝠——1952年7月23日，人们获得了一只大棕蝠。

[frʌm; frəm][wʌn][maɪl] [west] [ʌv; əv][naɪəˈbrɑːrə] , [nɑːks] ['kaʊnti] .
from one mile west of Niobrara, Knox County .
从 一 英里 西方 的 尼奥布拉拉 , 诺克斯 县 .

从诺克斯县尼奥布拉拉以西一英里处出发。

[waɪl] [nɑːt][soʊ][dɑːrk][ɪn] ['dɔːrsl] [kləˈreɪ(ə)n][æz; əz][sʌm; səm] ['spesɪmənz] [ʌv; əv][iː] . [ɛf] . ['fʌskəs]
While not so dark in dorsal coloration as some specimens of E. f. fuscus
尽管 不是 所以 黑暗的 在 背侧 着色 作为 一些 标本 的 E . f . 褐藻

[frʌm; frəm] ['iːstərn] [nəˈbræskə] ([kæs] [ænd; ænd] ['sɑːpi] ['kauntɪz]) ,
from eastern Nebraska (Cass and Sarpy counties) ,
从 东 内布拉斯加州 (卡斯 和 萨尔皮 县) ,

虽然背部颜色不像内布拉斯加州东部（卡斯县和萨皮县）的一些 E. f. fuscus 标本那样深，

[ðɪs] ['spesɪmən] [ɪz] ['noʊtɪsəbli] ['dɑːrkər][ðæn; ðən][ə; eɪ] ['sɪriːz] [ʌv; əv][iː] . [ɛf] . ['pælɪdəs][frʌm; frəm][ɛf tɪː] .
this specimen is noticeably darker than a series of E. f. pallidus from Ft.
这 标本 是 明显地 较暗 比 一个 系列 的 E . f . 苍白球 从 福特 .

[naɪəˈbrɑːrə]['waɪldlaɪf]['refjuːdʒ] ,
Niobrara Wildlife Refuge ,
尼奥布拉拉 野生动物 避难所 ,

这个标本的颜色明显比来自尼奥布拉拉堡野生动物保护区的一系列淡色拟哲水蚤（E. f. pallidus）要深。

[fɔːr][miː] . [iː][ʌv; əv]['væləntaɪn] , ['tʃeri] ['kaʊnti] ,
4 mi. E of Valentine, Cherry County ,
4 米 . E 的 情人节 , 樱桃 县 ,

位于切里县瓦伦丁以东 4 英里处

['biːɪŋ] [nɪr] (- " [dʒeɪ]) [snʌf] [braʊn] [æz; əz] [əˈpouzɪd] [tuː; tə] [nɪr] (- - [aɪ]) ['bʌkθɔːrn] [braʊn] .
being near (16 " j) Snuff Brown as opposed to near (16 ' i) Buckthorn Brown .
存在 靠近 (- " j) 鼻烟 棕色的 作为 反对 到 靠近 (- - 我) 鼠李 棕色的 .

靠近（16" j）Snuff Brown，而不是靠近（16' i）Buckthorn Brown。

[ˈpriːviəs] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈteɪkɪŋ] [ʌv; əv] [ðɪs] [ˈspesiˌmən] , [web] [ænd; ənd][dʒəʊnɪz] (- : **Previous to the taking of this specimen , Webb and Jones (1952 :** 以前的 到 这 采取 的 这 标本 , 韦伯 和 琼斯 (- :

在采集该标本之前，Webb 和 Jones (1952:

-) [rɪˈpɔːrtɪd] [æz; əz][iː] . [ef] . [ˈpæliˌdəs][ə; eɪ][ˈspesiˌmən] , [saɪvd] [æz; əz][ə; eɪ] [skʌl] [ˈoʊnli] , **277) reported as E . f . pallidus a specimen , saved as a skull only ,** -) 据报道 作为 E . f . 苍白球 一个 标本 , 已保存 作为 一个 颅骨 仅有的 ,

277) 被报道为苍白埃氏体 (E. f. pallidus)，该标本仅保存了头骨。

[wɪtʃ] [wʌz; wəz] [pɪkt] [ʌp] [ded] [æt; ət][naɪəˈbrɑːrə] . **which was picked up dead at Niobrara .** 哪个 曾是 挑选 向上 死的 在 尼奥布拉拉 :

在尼奥布拉拉发现的那具尸体。

[aɪˈtiː] [siːmz] [best][tuː; tə] [əˈsaɪn] [ðiːz] [tuː] [bæts][frʌm; frəm][ðə; ði][vəˈsɪnəti][ʌv; əv][naɪəˈbrɑːrə] , **It seems best to assign these two bats from the vicinity of Niobrara ,** 它 似乎 最好的 到 分配 这些 二 蝙蝠 从 这 附近 的 尼奥布拉拉 ,

似乎最好将这两只蝙蝠归类于尼奥布拉拉附近。

[nɑːks] [ˈkaʊnti] , [tuː; tə][iː] . [ef] . [ˈfʌskəs] . **Knox County , to E . f . fuscus .** 诺克斯 县 , 到 E . f . 褐藻 .

诺克斯县，至 E. f. fuscus。

[saɪˈʃʊərəs][kæərəlɪˈnɛnsɪs][kæərəlɪˈnɛnsɪs][ˈgmeɪlɪn] . **Sciurus carolinensis carolinensis Gmelin .** 松鼠 卡罗莱纳 卡罗莱纳 格梅林 .

卡罗莱松松鼠 carolinensis Gmelin。

[greɪ] [ˈskwɜːrəl] . — [æn; ən][əˈdʌlt; ˈædʌlt] [meɪl] [greɪ] [ˈskwɜːrəl] [[ɑːt] [baɪ][ˈmɪstər] . [ˈteri] [ə; eɪ] . [vɔːn] **Gray Squirrel . — An adult male gray squirrel shot by Mr . Terry A . Vaughan** 灰色的 松鼠 . — 一个 成人 男性 灰色的 松鼠 射击 经过 先生 . 特里 一个 . 沃恩

[ɪn][ðə; ði] [ˈheɪvɪli] [ˈtɪmbərd] [blʌfs] [ʌv; əv][ðə; ði] [mɪˈzʊəri] [ˈrɪvər] , **in the heavily timbered bluffs of the Missouri River ,** 在 这 重度 木材 悬崖 的 这 密苏里州 河 ,

灰松鼠——一只成年雄性灰松鼠，由特里·A·沃恩先生在密苏里河树木茂密的悬崖上射杀。

[θriː][miː] . [es] , [tuːˈtuː][miː] . **3 mi . S , 2 mi .** 3 米 . S , 2 米 .

南 3 英里，2 英里

[iː][ʌv; əv] [nəˈbræskə] [ˈsɪti] , [ˈoʊtəʊiː] [ˈkaʊnti] , [ɑːn][ɑːkˈtoʊbər] - , - , **E of Nebraska City , Otoe County , on October 10 , 1953 ,** E 的 内布拉斯加州 城市 , 奥托 县 , 在 十月 - , - ,

1953 年 10 月 10 日，内布拉斯加州奥托县东部，

[prəˈvaɪdz] [ðə; ði][ˈoʊnli][mjuˈziːəm] [ˈspesiˌmən] [ʌv; əv][ə; eɪ] [greɪ] [ˈskwɜːrəl][frʌm; frəm] [nəˈbræskə] [noʊn] **provides the only museum specimen of a gray squirrel from Nebraska known** 提供 这 仅有的 博物馆 标本 的 一个 灰色的 松鼠 从 内布拉斯加州 已知

[tuː; tə][em ˈiː] . **to me .** 到 我 .

这是据我所知内布拉斯加州唯一的灰松鼠博物馆标本。

[ˈrezɪdənts] [ɪn][ðə; ði] [ˈeriə] [kənˈsɜːrɪnd] [rɪˈpɔːrt] [smɔːl] [ˈnʌmbərz] [ʌv; əv] [ðɪs] [ˈskwɜːrəl][æz; əz] [stɪl] **Residents in the area concerned report small numbers of this squirrel as still** 居民 在 这 区域 担心的 报告 小的 数字 的 这 松鼠 作为 仍然

[əˈkɜːrɪŋ] [ɑːn][ðə; ði] [ˈheɪvɪli] [ˈwʊdɪd] [blʌfs] [əˈlɔːŋ] [ðə; ði] [mɪˈzʊəri] [ˈrɪvər] [ɪn][ˈneməˌhɑː] , **occurring on the heavily wooded bluffs along the Missouri River in Nemaha ,** 发生 在 这 重度 树木繁茂的 悬崖 沿着 这 密苏里州 河 在 内马哈 , 内马哈地区居民报告称，在密苏里河沿岸树木茂密的悬崖上，仍然可以看到少量这种松鼠的踪迹。

[ɪkˈstendz; ekˈstendz][ðə; ði] [noʊn] [ˌdʒiːəˈɡræfɪk] [reɪndʒ][ʌv; əv][es] . - [əˈprɑːksɪmətli] - [maɪlz]
extends the known geographic range of S . franklinii approximately 200 miles
扩展 这 已知 地理 范围 的 S . - 大约 - 英里
[ˈwestwərd] [əˈlɔːŋ] [ðə; ði] [plæt] [ˈrɪvər] [ˈvæli] [frɑːm; frəm] [ˈkɜːni] ,
westward along the Platte River Valley from Kearney ,
向西 沿着 这 普拉特 河 谷 从 科尔尼 ,
已知 S. franklinii 的地理分布范围沿普拉特河谷向西延伸约 200 英里，从 Kearney 开始。

[ˈbʌfələʊ] [ˈkaʊnti] ([siː] [ˈhʌvəl] , - : -) ,
Buffalo County (see Howell , 1938 : 134) ,
水牛 县 (看 豪厄尔 , - : -) ,
布法罗县（参见 Howell，1938：134），
[ænd; ənd][səˈdʒests; səɡˈdʒests][ə; eɪ] [ˈwestwərd] [ˈmuːvmənt] [ʌv; əv] [ðɪs] [ɡraʊnd] [ˈskwɜːrəl] [əˈlɔːŋ] [ðə; ði]
and suggests a westward movement of this ground squirrel along the
和 建议 一个 向西 移动 的 这 地面 松鼠 沿着 这
[plæt] [ˈrɪvər] [ɪn][ˈriːs(ə)nt] [ˈjɪrɪz] .
Platte River in recent years .
普拉特 河 在 最近的 年 .
这表明近年来这种地松鼠沿着普拉特河向西迁徙。

[ˌperɒʊˈnɑːθəs] [fləˈvesənz] [fləˈvesənz] [ˈmɛriːəm] .
Perognathus flavescens flavescens Merriam .
佩罗格纳图斯 黄花 黄花 梅里亚姆 .
黄鳍齿甲（Perognathus flavescens flavescens Merriam.）
[pleɪnz] [ˈpɑːkɪt] [maʊs] . — [piː] . [ef] . [fləˈvesənz] [əˈkɜːrɪz] [ɪn][ðə; ði][sænd] [hɪlz] [ænd; ənd][əˈdʒeɪs(ə)nt]
Plains Pocket Mouse . — P . f . flavescens occurs in the Sand Hills and adjacent
平原 口袋 老鼠 . — P . f . 黄花 发生 在 这 沙 丘陵 和 邻近的
[mɪkst] - [ɡræs] [pleɪnz] [ʌv; əv] [ˈsentrəl] [nəˈbræskə] .
mixed - grass plains of central Nebraska .
混合 - 草 平原 的 中央 内布拉斯加州 .
平原口袋鼠——P. f. flavescens 分布于内布拉斯加州中部的沙丘和邻近的混生草原。

[ˈiːstərn] [ˈmɑːrdʒɪn(ə)] [ˈrekərdz] [ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] [ɑːr; ər] : [ˈniːləɪ] , [ˈæntɪloʊp] [ˈkaʊnti] , [tuːˈtuː] ([ɛmviːz]
Eastern marginal records of occurrence are : Neligh , Antelope County , 2 (MVZ
东 边缘 记录 的 发生 是 : 内利格 , 羚羊 县 , 2 (MVZ
[wʌŋ] , [ɛnˈɛsˈɛm] [wʌŋ]) ;
1 , NSM 1) ;
1 , 国家安全机制 1) ;
东部边缘记录的发生情况有：内利格，羚羊县，2（MVZ 1，NSM 1）；
[wʌŋ][miː] . [iː][ʌv; əv][rəˈvenə; rɑːˈvennɑː] , [ˈbʌfələʊ] [ˈkaʊnti] , [tuːˈtuː] ([ɛmˈziː]) ; [ʌnˈspesɪfaɪd] [loʊˈkæləti][ɪn]
1 mi . E of Ravenna , Buffalo County , 2 (MZ) ; unspecified locality in
1 米 . E 的 拉文纳 , 水牛 县 , 2 (MZ) ; 未指定 地点 在
[ˈædəmz] [ˈkaʊnti] , [wʌŋ] ([ˌeɪtʃˈem]) .
Adams County , 1 (HM) .
亚当斯 县 , 1 (HM) .
布法罗县拉文纳以东 1 英里，2 (MZ)；亚当斯县未指明地点，1 (HM)。

[ˌperɒʊˈnɑːθəs] [fləˈvesənz] - [ˈɑːsgʊd] .
Perognathus flavescens perniger Osgood .
佩罗格纳图斯 黄花 - 奥斯古德 .
Perognathus flavescens perniger Osgood.
[pleɪnz] [ˈpɑːkɪt] [maʊs] . — [ðɪs] [maʊs] [əˈkɜːrɪz] [ɪn] [ˌnɔːrθiːstərn] [nəˈbræskə] .
Plains Pocket Mouse . — This mouse occurs in northeastern Nebraska .
平原 口袋 老鼠 . — 这 老鼠 发生 在 东北部 内布拉斯加州 .
平原口袋鼠——这种老鼠分布于内布拉斯加州东北部。

[ˈɑːsgʊd] (- : -) , [ɪn][ðə; ði][əˈrɪdʒən(ə)l] [dɪˈskɹɪpʃn] [ʌv; əv][ðə; ði] [ˈsʌbspiːʃiːz] , [ˈlɪstɪd] [tuː] **Osgood (1904 : 127) , in the original description of the subspecies , listed two** 奥斯古德 (- : -) , 在这 原来的 描述 的 这 亚种 , 列出 二 [ˈspesɪmənz] [frʌm; frəm][ˈvɜːrdɪɡriː,ˈvɜːrdɪɡriːs] [ˈvɜːrdɪɡriː] , **specimens from Verdigris [Verdigre] ,** 标本 从 铜绿 [铜绿] ,

Osgood (1904: 127) 在对该亚种的原始描述中，列出了来自 Verdigris [Verdigre] 的两个标本，

[nɑːks] [ˈkaʊnti] . **Knox County** : 诺克斯 县 .

诺克斯县。

[əˈdɪʃən(ə)l] [ˈrekərdz] [ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] [ɑːr; ər] : [ˈbiːmɜː] , [ˈkʌmɪŋ] [ˈkaʊnti] , [tuːˈtuː] ([ˈjuː,ɛsˈbiːz]) ; [wʌn] **Additional records of occurrence are : Beemer , Cuming County , 2 (USBS) ; 1** 额外的 记录 的 发生 是 : 宝马 , 库明 县 , 2 (USB接口) ; 1 - [wʌn] / [tuːˈtuː][miː] . [es ˈiː][ʌv; əv][,naɪəˈbrɑːrə] , - **1 / 2 mi . SE of Niobrara ,** - 1 / 2 米 : 东南 的 尼奥布拉拉 ,

其他发生记录包括：比默，卡明县，2（USBs）；尼奥布拉拉东南 1.5 英里处，

[nɑːks] [ˈkaʊnti] , [θriː] ; [wʌn] - [wʌn] / [tuːˈtuː][miː] . [es][ʌv; əv] [ˈpɪlgə] , [ˈstæntən; ˈstɑː-] [ˈkaʊnti] , [tuːˈtuː] . **Knox County , 3 ; 1 - 1 / 2 mi . S of Pilger , Stanton County , 2 :** 诺克斯 县 , 3 ; 1 - 1 / 2 米 : S 的 皮尔格 , 斯坦顿 县 , 2 : 诺克斯县，3；位于斯坦顿县皮尔格以南 1.5 英里处，2。

[ðə; ði] [tuː] [ˈspesɪmənz] [frʌm; frəm] [ˈbiːmɜː] [ɑːr; ər][ˈtɪpɪk(ə)l] - . **The two specimens from Beemer are typical perniger .** 这 二 标本 从 宝马 是 典型的 - .

来自比默的两个标本是典型的 perniger。

[ɔːl] [ʌv; əv][ðə; ði] [ˈʌðər] [nəˈbræskən; ni-] [ˈspesɪmənz] [ɑːr; ər] [ɪntərˈɡred] [brɪˈtwiːn] [piː] . [ef] . [fləˈvesənz] **All of the other Nebraskan specimens are intergrades between P . f . flavescens** 全部 的 这 其他 内布拉斯加州 标本 是 中间级 之间 P : f : 黄花 , [ˌdʒiːəˈɡræfɪkli] [əˈdʒeɪs(ə)nt][tuː; tə][ðə; ði] [west] , , **geographically adjacent to the west ,** , 地理上 邻近的 到 这 西方 ,

内布拉斯加州的其他所有标本都是与西部地理位置相邻的 P. f. flavescens 之间的过渡类型。

[ænd; ənd][piː] . [ef] . - [tuː; tə][ðə; ði] [iːst] [bʌt; bət][ɑːr; ər] [best] [rɪˈfɜːrd] [tuː; tə] - [ɑːn] **and P . f . perniger to the east but are best referred to perniger on** 和 P : f : - 到 这 东方 但 是 最好的 指 到 - 在 [ðə; ði][ˈbeɪsɪs][ʌv; əv] [ˈɡreɪtər] [ˈtoʊt(ə)l][lenkθ; lenθ] , **the basis of greater total length ,** 这 基础 的 更大的 全部的 长度 ,

东部有 P. f. perniger，但根据其总长度更大，最好将其归为 perniger。

[ˈlɑːrdʒər][ˈkreɪniəl] [ˈmeɪʒərmənts] [ænd; ənd][ˈdɑːrkər] [ˈdɔːrsl] [ˌklʌləˈreɪ(ə)n] . **larger cranial measurements and darker dorsal coloration .** 更大的 颅骨 测量 和 较暗 背侧 着色 .

颅骨尺寸较大，背部颜色较深。

[piː] . [ef] . - [wʌz; wəz][əˈrɪdʒənəli] [dɪˈskraɪbd] ([ˈɑːsgʊd] , [ɑːp] . [sɪt] .) **P . f . perniger was originally described (Osgood , op . cit .)** P : f : - 曾是 起初 描述 (奥斯古德 , 操作 : 引用 .)

P. f. perniger 最初由（Osgood，同上）描述。

[ɑ:n][ðə; ði][ˈbeɪsɪs][ʌv; əv][ɪts][ˈdɑ:rkər] [ˈdɔ:rsɪ] [ˌklə'reɪ(ə)n][ænd; ənd] [ɪnˈkroʊtʃmənt] [ʌv; əv][ðə; ði][ˈlætərəl]
on the basis of its darker dorsal coloration and encroachment of the lateral
在这基础 的 它是 较暗 背侧 着色 和 侵犯 的 这 侧
[laɪn][ɑ:n][ðə; ði] [pɑ:'striər] [pɑ:rts][ʌv; əv][ðə; ði][ˈventər] .
line on the posterior parts of the venter .
线 在 这 后部 部分 的 这 腹部 .

根据其较深的背部颜色和侧线向腹部后部的延伸情况判断。

[ðə; ði][ˈlætər] [ˈkærəktər] [ɪz][nɑ:tɪ][ˈprez(ə)nt][ɪn][ɔ:lɪ] [nəˈbræskən; ni-] [ˈspesimənz] .
The latter character is not present in all Nebraskan specimens .
这 后者 特点 是 不是 展示 在 全部 内布拉斯加州 标本 .

后一种特征并非所有内布拉斯加州标本都具有。

[maɪs][frʌm; frəm][ðə; ði] [tu:] [ləuˈkælitiz][ɪn][nɑ:ks] [ˈkaʊnti] [hæv; həv] [ˈbʌfi] [ˈʌndəpɑ:t] ;
Mice from the two localities in Knox County have buffy underparts ;
小鼠 从 这 二 地方 在 诺克斯 县 有 吸血鬼猎人巴菲 下半身 ;

来自诺克斯县这两个地区的鼠类腹部呈淡黄色；

[ðoʊz] [frʌm; frəm] [ˈʌðər] [nəˈbræskən; ni-] [ləuˈkælitiz][du:][nɑ:t] .
those from other Nebraskan localities do not .
那些 从 其他 内布拉斯加州 地方 做 不是 .

来自内布拉斯加州其他地区的人则没有这种待遇。

[ʌv; əv][naɪn] [ˈspesimənz] [ʌv; əv][pi:] . [ef] . - [ɪɡˈzæmɪnd][frʌm; frəm][elk] [ˈrɪvər] , [ˈʃɜ:bɜ:n]
Of nine specimens of P . f . perniger examined from Elk River , Sherburne
的 九 标本 的 P . f . - 检查 从 麋鹿 河 , 舍伯恩
[ˈkaʊnti] ,
County ,
县 ,

在对来自舍伯恩县埃尔克河的九个 P. f. perniger 标本进行检查后发现，

[ˌmɪnɪˈsoʊtə] , [nʌn] [hæz; həz] [ˈbʌfi] [ˈʌndəpɑ:t] [ˌwerˈæz] [ə; eɪ][ˈspesɪmən][frʌm; frəm] [ˈrændɒlf] ,
Minnesota , none has buffy underparts whereas a specimen from Randolph ,
明尼苏达州 , 没有任何 有 吸血鬼猎人巴菲 下半身 然而 一个 标本 从 兰道夫 ,
[ˈfrɪmɑ:nt] [ˈkaʊnti] , [ˈaɪər] ([ɛnˈɛsˈɛm]) [dʌz] .
Fremont County , Iowa (NSM) does .
弗里蒙特 县 , 爱荷华州 (国家安全机制) 做 .

明尼苏达州的标本都没有淡黄色的下体，而爱荷华州弗里蒙特县兰道夫的标本（NSM）则有淡黄色的下体。

[ɪn] [əˈdɪ(ə)n] , [ɪn] [tu:] [ʌv; əv][faɪv] [ˈspesimənz] [ʌv; əv][pi:] . [ef] . [fləˈvesənz] [frʌm; frəm][ˈkelsoʊ] ,
In addition , in two of five specimens of P . f . flavescens from Kelso ,
在 添加 , 在 二 的 五 标本 的 P . f . 黄花 从 凯尔索 ,

此外，在凯尔索采集的五个黄花拟南芥标本中，有两个标本中也发现了黄花拟南芥。

[ˈhʊkər] [ˈkaʊnti] , ([ɛmˈzi:]) [ðə; ði][ˈlætərəl][laɪn] [enˈkrəʊtʃɪz] [ɑ:n][ðə; ði] [ˈʌndəpɑ:t] .
Hooker County , (MZ) the lateral line encroaches on the underparts .
妓女 县 , (MZ) 这 侧 线 侵占 在 这 下半身 .

胡克县（MZ）侧线侵占下体。

[ðə; ði] [ɪnˈkroʊtʃmənt] [ʌv; əv][ðə; ði][ˈlætərəl][laɪn][ɑ:n][ðə; ði] [ˈʌndəpɑ:t] , [ɔ:r] [ˈfeɪljər] [ʌv; əv][ðə; ði][laɪn]
The encroachment of the lateral line on the underparts , or failure of the line
这 侵犯 的 这 侧 线 在 这 下半身 , 或者 失败 的 这 线
[tu:; tə][du:][soʊ] ,
to do so ,
到 做 所以 ,

侧线侵占下体，或侧线未能侵占下体，

[ɪz] [θɔ:t] [tu:; tə][bi:; bi][ˈoʊnli][æn; ən][ˌɪndrɪˈvɪdʒuəl][ˌveriˈeɪ(ə)n][ænd; ənd][ʌv; əv][noʊ][ˌtæksəˈnɔ:mɪk][ju:z] .
is thought to be only an individual variation and of no taxonomic use .
是 想法 到 是 仅有的 一个 个人 变化 和 的 不 分类学 使用 .

被认为只是个体差异，没有分类学意义。

[ˌpɛrəʊˈnɑːθəs] [ˈflɛɪvəs] - [gəʊld,mən] .
Perognathus flavus piperi Goldman .
佩罗格纳图斯 黄 - 高盛 .

Perognathus flavus piperi Goldman.

[ˈbʌfi] [ˈpɑːkɪt] [maʊs] . — [ɪn][ðə; ði] [dɪˈskɪpʃn] [ʌv; əv][piː] . [ef] . - , [ˈkɑːkrəm] (- :
Buffy Pocket Mouse . — In the description of P . f . bunker er i , Cockrum (1951 :
吸血鬼猎人巴菲 口袋 老鼠 . — 在 这 描述 的 P . f . - , 考克伦 (- :
-) [ˈæləkeɪtɪd] [tuː; tə][ðə; ði] [nuː] [ˈsʌbspɪːʃiːz] ,
206) allocated to the new subspecies ,
-) 分配 到 这 新的 亚种 ,

巴菲袋鼠——在对 P. f. bunker*i* 的描述中，Cockrum (1951: 206) 将这一新亚种归入其中。

[wɪˈðəʊt] [ˈkɑːment] , [ə; eɪ] [ˈspesɪmən] [frʌm; frəm] [əˈlaɪəns] , [bɑːks] [bjʊːt] [ˈkɑʊnti] .
without comment , a specimen from Alliance , Box Butte County .
没有 评论 , 一个 标本 从 联盟 , 盒子 比尤特 县 .

未加评论，标本来自宾夕法尼亚州博克斯比特县联盟镇。

[aɪ][hæv; həv] [ɪgˈzæmɪnd] [ðɪs] [ˈspesɪmən] [əˈlɔːŋ] [wɪð; wɪθ][ɔːl] [ˈʌðər] [nəˈbræskən; ni-] [ˈspesɪmənz] [noʊn]
I have examined this specimen along with all other Nebraskan specimens known
我 有 检查 这 标本 沿着 和 全部 其他 内布拉斯加州 标本 已知
[tuː; tə][em ˈiː][ænd; ənd] ,
to me and ,
到 我 和 ,

我已将此标本与我所知的所有其他内布拉斯加州标本一起进行检查，并且，

[ɔːlˈðoʊ] [ɔːl] [əˈproʊt] - [ɪn][ˈkreɪniəl] [ˈmezərmənts] ,
although all approach bunker i in cranial measurements ,
虽然 全部 方法 - 在 颅骨 测量 ,

尽管所有方法都接近颅骨测量，

[ðeɪ] [siːm] [best] [rɪˈfɜːrd] [tuː; tə] - [ɑːn][ðə; ði][ˈbeɪsɪs][ʌv; əv][ˈdɑːrkər] [ˈdɔːrsl] [ˌkʌləˈreɪ(ə)n][ænd; ənd]
they seem best referred to piperi on the basis of darker dorsal coloration and
他们 似乎 最好的 指 到 - 在 这 基础 的 较暗 背侧 着色 和
[ˈlɑːrdʒər][ɪkˈstɜːrn(ə)l] [ˈmezərmənts] .
larger external measurements .
更大的 外部的 测量 .

根据较深的背部颜色和较大的外部尺寸，它们似乎最适合归类为 piper*i*。

[əˈdɪʃən(ə)l] [ˈrekərdz][ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] , [ˈsevrəl] [ʌv; əv][ðəm; ðəm][ˈmɑːrdʒɪn(ə)l][tuː; tə][ðə; ði] [ˈiːstwərd] ,
Additional records of occurrence , several of them marginal to the eastward ,
额外的 记录 的 发生 , 一些 的 他们 边缘 到 这 向东 ,
[ɑːr; ər] : - [miː] . [es][ʌv; əv][ˈæntiːɑːk] ,
are : 10 mi . S of Antioch ,
是 : - 米 . S 的 安提阿 ,

其他出现记录，其中一些位于东部边缘，包括：安提阿以南 10 英里处，

[ˈgɑːrdn] [ˈkɑʊnti] , [wʌn] ([ɛmˈziː]) ; [ˈkɛlsoʊ] , [ˈhʊkər] [ˈkɑʊnti] , [fɔːr] ([ɛmˈziː]) ; [faɪv][miː] . [en][ʌv; əv]
Garden County , 1 (MZ) ; Kelso , Hooker County , 4 (MZ) ; 5 mi . N of
花园 县 , 1 (MZ) ; 凯尔索 , 妓女 县 , 4 (MZ) ; 5 米 . N 的
[ˈbrɪdʒpɔːrt] ,
Bridgeport ,
布里奇波特 ,

加登县，1 (MZ)；胡克县凯尔索，4 (MZ)；布里奇波特以北 5 英里，

[mɔːri:l] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ɛmvi:z]) ; [sɪks][mi:] . [en][ʌv; əv] ['mɪtʃəl] , ['skɑ:ts] [blʌf] ['kaʊnti] , [wʌn] (**Morrill County** , **1** (**MVZ**) ; **6** **mi** . **N** **of** **Mitchell** , **Scotts Bluff County** , **1** (莫里尔 县 , 1 (MVZ) ; 6 米 . N 的 米切尔 , 斯科茨 虚张声势 县 , 1 ([ɛn'ɛs'ɛm])). **NSM**) :
国家安全机制) :

莫里尔县，1（MVZ）；米切尔以北 6 英里，斯科茨布拉夫县，1（NSM）。

[ə; eɪ][ˈspesɪmən][nɑ:t] [si:n] [baɪ][em 'i:] [ðæt] [wʌz; wəz] [rɪˈpɔ:rtɪd] [frʌm; frəm][ˈvæləntaɪn] , [ˈtʃeri] ['kaʊnti] (**A specimen not seen by me that was reported from Valentine , Cherry County** (一个 标本 不是 已见 经过 我 那 曾是 据报道 从 情人节 , 樱桃 县 ([bi:d] , **Beed** , 比德 ,
据报道，在切里县瓦伦丁（比德县）发现了一个我没有亲眼见过的标本。

- : -) , [ɪz] [prɪˈzu:məbli] [ˈɔ:lsoʊ][best] [rɪˈfɜ:rd] [tu:; tə][pi:] . [ef] . - .
1936 : 21) , **is presumably also best referred to P . f . piperi** .
- : -) , 是 想必 还 最好的 指 到 P . f . - .
1936: 21), 大概也最好是指 P. f. piperi。

[noʊ] ['spesimənz] [ʌv; əv][pi:] . ['fleɪvəs][ɑ:r; ər] [noʊn] [tu:; tə][em 'i:][frʌm; frəm] [saʊθ] [ʌv; əv][ðə; ði] [plæt] **No specimens of P . flavus are known to me from south of the Platte**
不 标本 的 P . 黄 是 已知 到 我 从 南 的 这 普拉特
[ˈrɪvər][ɪn] [ˌsaʊθ'westərn] [nə'bræskə] [ɔ:l'doʊ] [ðeɪ] [ˈprɑ:bəbli] [ə'kɜ:r] [ðer; ðər] .
River in southwestern Nebraska although they probably occur there .
河 在 西南 内布拉斯加州 虽然 他们 大概 发生 那里 .
虽然我知道内布拉斯加州西南部普拉特河以南没有黄褐拟青霉的标本，但它们可能在那里存在。

[ɪf] [soʊ] , [ðeɪ] [meɪ] [bi:; bi][rɪˈfɜ:rəbl,'refrəbl][tu:; tə][pi:] . [ef] . - ,
If so , they may be referable to P . f . bunkeri ,
如果 所以 , 他们 可能 是 可参考的 到 P . f . - ,
如果是这样，它们可能与 P. f. bunkeri 有关。

[wɪtʃ] [ɪz] [faʊnd] [ɪn] ['kauntɪz] [ʌv; əv][ˈkænzəs] [ə'dʒɔɪnɪŋ] [ðə; ði] [ˌsaʊθ'westərn] [pɑ:rt][ʌv; əv] [nə'bræskə] .
which is found in counties of Kansas adjoining the southwestern part of Nebraska .
哪个 是 成立 在 县 的 堪萨斯州 相邻的 这 西南 部分 的 内布拉斯加州 .
它位于堪萨斯州与内布拉斯加州西南部接壤的几个县。

[ˌperəʊ'nɑ:θəs] ['hɪspɪdəs][ˌpærə'dɑ:ksəs] ['meri:əm] .
Perognathus hispidus paradoxus Merriam .
佩罗格纳图斯 粗毛 悖论 梅里亚姆 .
Perognathus hispidus paradoxus Merriam。

['hɪspɪd] ['pɑ:kɪt] [maʊs] . — [ðɪs] ['sʌbspɪ:'fi:z] [ə'kɜ:rz] ['kɑ:mənli] [ɪn][ˈsentrəl] - [ænd; ənd] ['westərn] -
Hispid Pocket Mouse . — This subspecies occurs commonly in central - and western -
粗糙的 口袋 老鼠 . — 这 亚种 发生 通常 在 中央 - 和 西 -
[nə'bræskə] .
Nebraska .
内布拉斯加州 .

粗毛袋鼠——该亚种常见于内布拉斯加州中部和西部。

[ˈi:stərn] [ˈmɑ:rdʒɪn(ə)l][ˈrekərdz][ʌv; əv] [ə'kɜ:rəns] [ɑ:r; ər] : [tu:ˈtu:][mi:] . [es 'i:][ʌv; əv][naɪə'brɑ:rə] , [nɑ:ks]
Eastern marginal records of occurrence are : 2 **mi . SE of Niobrara , Knox**
东 边缘 记录 的 发生 是 : 2 米 . 东南 的 尼奥布拉拉 , 诺克斯
['kaʊnti] ,
County ,
县 ,
东部边缘分布记录为：诺克斯县尼奥布拉拉东南 2 英里处。

[wʌn] (-) ; [fɔːr][miː] : [iː] , [tuːˈtuː][miː] . [es][ʌv; əv] [ˈɔrd] , [wʌn] ; ['bleidən] , ['webstər] ['kaʊnti] , **1 (NGFPC) ; 4 mi . E , 2 mi . S of Ord , 1 ; Bladen , Webster County ,** **1 (-) ; 4 米 . E , 2 米 . S 的 奥德 , 1 ; 布莱登 , 韦伯斯特 县 ,** [tuːˈtuː] ([ˌeɪtʃˈem]) . **2 (HM) .** **2 (HM) .**

1 (NGFPC); Ord 以东 4 英里，以南 2 英里，1；Bladen，韦伯斯特县，2 (HM)。

[ˌpɛrəʊˈnɑːθəs] ['hɪspɪdəs] - ['mɛri:əm] . **Perognathus hispidus spilotus Merriam .** **佩罗格纳图斯 粗毛 - 梅里亚姆 .**

Perognathus hispidus spilotus Merriam。

['hɪspɪd] ['pɑːkɪt] [maʊs] . — [dʒəʊnz][ænd; ənd] [web] (- : **Hispid Pocket Mouse . — Jones and Webb (1949 :** **粗糙的 口袋 老鼠 . — 琼斯 和 韦伯 (- :**

毛茸茸的口袋鼠。——琼斯和韦伯（1949 年：

-) [fɜːrst] [rɪˈpɔːrtɪd] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [ɪn] [nəˈbræskə] [æz; əz][frʌm; frəm][faɪv][miː] . [ˌes ˈiː][ʌv; əv] ['ruːləʊ] , **312) first reported this subspecies in Nebraska as from 5 mi . SE of Rulo ,** **-) 第一的 据报道 这 亚种 在 内布拉斯加州 作为 从 5 米 . 东南 的 鲁洛 ,** [ˈrɪtʃərdəsən] ['kaʊnti] . **Richardson County .** **理查森 县 .**

312) 首次报道了内布拉斯加州的这一亚种，发现于理查森县鲁洛东南 5 英里处。

[əˈdɪʃən(ə)l] ['rekərdz][ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] [ɑːr; ər] : [θriː][miː] . [esˈdʌbljuː][ʌv; əv] ['bɑrnstən] , [geɪdʒ] ['kaʊnti] , **Additional records of occurrence are : 3 mi . SW of Barnston , Gage County ,** **额外的 记录 的 发生 是 : 3 米 . 西南 的 巴恩斯顿 , 盖奇 县 ,** [wʌn] (-) ; **1 (NGFPC) ;** **1 (-) ;**

其他发生记录为：巴恩斯顿西南 3 英里，盖奇县，1（NGFPC）；

['benɪt] , [wʌn] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) , [naɪn][miː] . [ˌɛnˈdʌlbəljuː][ʌv; əv] ['lɪŋkən] , [wʌn] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) , [wʌn] - [wʌn] / **Bennet , 1 (NSM) , 9 mi . NW of Lincoln , 1 (NSM) , 1 - 1 /** **贝内特 , 1 (国家安全机制) , 9 米 . 西北 的 林肯 , 1 (国家安全机制) , 1 - 1 /** [tuːˈtuː][miː] . [es][ʌv; əv] ['lɪŋkən] , **2 mi . S of Lincoln ,** **2 米 . S 的 林肯 ,**

贝内特，1（NSM），林肯西北 9 英里，1（NSM），林肯以南 1.5 英里，

[wʌn] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) , ['læŋkæstər] ['kaʊnti] ; [pəˈruː] , ['nɛməˌhɑː] ['kaʊnti] , [wʌn] (-) ; [θriː][miː] . [es] , **1 (NSM) , Lancaster County ; Peru , Nemaha County , 1 (NGFPC) ; 3 mi . S ,** **1 (国家安全机制) , 兰开斯特 县 ; 秘鲁 , 内马哈 县 , 1 (-) ; 3 米 . S ,** [tuːˈtuː][miː] . **2 mi .** **2 米 .**

1 (NSM)，兰开斯特县；秘鲁，内马哈县，1 (NGFPC)；南 3 英里，2 英里。

[iː][ʌv; əv] [nəˈbræskə] ['sɪti] , ['oʊtoʊiː] ['kaʊnti] , [θriː] ; [bəˈrɑːdə] , ['rɪtʃərdəsən] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) **E of Nebraska City , Otoe County , 3 ; Barada , Richardson County , 1 (NSM)** **E 的 内布拉斯加州 城市 , 奥托 县 , 3 ; 巴拉达 , 理查森 县 , 1 (国家安全机制)** ; ['plez(ə)nt] [deɪl] , **;** **Pleasant Dale ,** **;** **;** **令人愉快的 戴尔 ,**

内布拉斯加城东部，奥托县，3；巴拉达，理查森县，1（NSM）；普莱森特戴尔，

['suːɜːd] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ˌɛnˈɛsˈɛm]) ; [wʌn][miː] . [es][ʌv; əv] ['wɪljəmz] , ['θeɪɜː] ['kaʊnti] , [wʌn] . **Seward County , 1 (NSM) ; 1 mi . S of Williams , Thayer County , 1 .** **西沃德 县 , 1 (国家安全机制) ; 1 米 . S 的 威廉姆斯 , 泰耶 县 , 1 .**

苏厄德县，1（NSM）；威廉姆斯以南 1 英里，泰耶县，1。

[glæs] (-) [rɪ'fɜːrd] [ə; eɪ] ['spesɪməŋ] [frʌm; frəm][naɪn][miː] . [ˌen'dʌbəljʊː][ʌv; əv] ['lɪŋkən] ,
Glass (1947 : 179) referred a specimen from 9 mi . NW of Lincoln ,
玻璃 (-) 指 一个 标本 从 9 米 : 西北 的 林肯 ;
['læŋkæstər] ['kaʊntɪ] ,
Lancaster County ,
兰开斯特 县 ,

Glass (1947: 179) 提到了一份来自兰开斯特县林肯西北9英里的标本，

[tuː; tə][piː] . [eɪtʃ] . [ˌpærə'dɑːksəs] .
to P . h . paradoxus .
到 P . h . 悖论 .

致 P. h. paradoxus。

[ɪn] [dɪ'skʌʃɪŋ] [ðə; ði][zoʊŋ][ʌv; əv][ˌɪntəgrer'deɪʃən; ˌɪntəgrə'deɪʃən] [brɪ'twiːn] - [ænd; ənd]
In discussing the zone of intergradation between spilotus and
在 讨论 这 区 的 相干 之间 - 和
[ˌpærə'dɑːksəs] , [ˌdʒiːə'græfɪkli] [ə'dʒeɪs(ə)nt][tuː; tə][ðə; ði][west] ,
paradoxus , geographically adjacent to the west ,
悖论 , 地理上 邻近的 到 这 西方 ,

在讨论位于西部的 spilotus 和 paradoxus 之间的过渡区域时，

[hiː; hi] [raʊt] ([ɑːp] .
he wrote (op .
他 写道 (操作 :

他写道（同上）。

[sɪt] . : -) , " [aɪ 'tiː][ɪz] ['eɪvɪdənt] [ðæt] [aɪ 'tiː] ['prəʊsiːdʒ] [ˌnoːrθ'iːstwərdz] ,
cit . : 178) , " It is evident that it proceeds northeastwards ,
引用 : : -) , " 它 是 明显 那 它 收益 向东北方向 ,

引文：178)，“很明显，它是向东北方向延伸的，

[təːrd] [ðə; ði] [mɪ'zɔːri] ['rɪvər] [sɪns] [tuː'tuː] ['spesɪmənz] [frʌm; frəm] ['iːstərn] [nə'bræskə] ,
toward the Missouri River since 2 specimens from eastern Nebraska ,
朝向 这 密苏里州 河 自从 2 标本 从 东 内布拉斯加州 ,

自内布拉斯加州东部发现2个标本以来，人们一直朝着密苏里河方向研究。

[ə; eɪ]['dʒuvənəl; 'dʒuːvənəl][frʌm; frəm] ['webstər] ['kaʊntɪ] [ænd; ənd][æn; ən][ə'dʌlt; 'ædʌlt][frʌm; frəm]
a juvenile from Webster County and an adult from
一个 少年 从 韦伯斯特 县 和 一个 成人 从
['læŋkæstər] ['kaʊntɪ] , [ɑːr; ər][bəʊθ]['tɪpɪk(ə)l][ˌpærə'dɑːksəs] .
Lancaster County , are both typical paradoxus .
兰开斯特 县 , 是 两个都 典型的 悖论 .

一名来自韦伯斯特县的青少年和一名来自兰开斯特县的成年人，都是典型的悖论案例。

" [aɪ][hæv; həv][ɪɡ'zæmɪnd][ðə; ði] ['spesɪməŋ] [frʌm; frəm] ['webstər] ['kaʊntɪ] [rɪ'fɜːrd] [tuː; tə][baɪ] [glæs]
" **I have examined the specimen from Webster County referred to by Glass**
" 我 有 检查 这 标本 从 韦伯斯特 县 指 到 经过 玻璃
[ænd; ənd] [ə'griː] [ðæt] [aɪ 'tiː][ɪz][ˌpærə'dɑːksəs] .
and agree that it is paradoxus .
和 同意 那 它 是 悖论 .

“我检查了格拉斯提到的韦伯斯特县的标本，并同意它是悖论。

[aɪ][hæv; həv][nɔːt] [siːn] [ðə; ði] ['spesɪməŋ] [frʌm; frəm]
I have not seen the specimen from
我 有 不是 已见 这 标本 从

我还没有见过标本。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[**Pg 485**]
[页 -]

[ˈnaɪn][ˈmiː] . [ˌɛnˈdʌbəljuː][ˈlʌv; əv] [ˈlɪŋkən]
9 mi . NW of Lincoln
9 米 . 西北 的 林肯

林肯西北9英里

; [haʊˈevər] , [əˈnʌðər] [ˈspesɪmən][frʌm; frəm][ðer; ðər] , [tuː] [ˈlðər] [frʌm; frəm][ˈlæŋkæstər] [ˈkaʊnti] ,
; **however , another specimen from there , two others from Lancaster County** ,
; 然而 , 其他 标本 从 那里 , 二 其他的 从 兰开斯特 县 ,
然而, 那里还发现了另一个标本, 兰开斯特县还发现了另外两个标本。

[ænd; ənd][wʌn][frʌm; frəm] [ˈsuːɜːd] [ˈkaʊnti] ([siː] [əˈbʌv]) , [ɑːr; ər] [hɪr] [rɪˈfɜːrd] [tuː; tə][piː] . [ertʃ] .
and one from Seward County (see above) , are here referred to P . h .
和 一 从 西沃德 县 (看 多于) , 是 这里 指 到 P . h .
-
spilotus ,
- ,

其中一株来自苏厄德县（见上文），这里将其归类为 P. h. spilotus。

[ˈræðər][ðæn; ðən][piː] . [ertʃ] . [ˌpærəˈdɑːksəs] ,
rather than P . h . paradoxus ,
相当 比 P . h . 悖论 ,

而不是 P. h. paradoxus,

[ɑːn][ðə; ði][ˈbeɪsɪs][ˈlʌv; əv][ˈnoʊtəbli][ˈdɑːrkər] [ˈdɔːrsl] [ˌkʌləˈreɪ](ə)n][ænd; ənd] [ˈsmɔːlər] [ɪkˈstɜːrn(ə)l][ænd; ənd]
on the basis of notably darker dorsal coloration and smaller external and
在 这 基础 的 尤其 较暗 背侧 着色 和 较小的 外部的 和
[ˈkreɪniəl] [ˈmezərmənts] .
cranial measurements .
颅骨 测量 .

根据明显较深的背部颜色和较小的外部及颅部尺寸判断。

[ðə; ði][reɪndʒ][ˈlʌv; əv][piː] . [ertʃ] . - [ɪn] [nəˈbræskə] , [æz; əz][ˈprez(ə)ntli] [noʊn] , [ˈðerfɔːr] , [ɪz]
The range of P . h . spilotus in Nebraska , as presently known , therefore , is
这 范围 的 P . h . - 在 内布拉斯加州 , 作为 目前 已知 , 所以 , 是
[ˈlɪmɪtɪd] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈiːstərn] ,
limited to the eastern ,
有限的 到 这 东 ,

因此, 目前已知的 P. h. spilotus 在内布拉斯加州的分布范围仅限于东部地区。

[mɔːr] [ˈhjuːmɪd][pɑːrt][ˈlʌv; əv][ðə; ði] [stert] , [saʊθ] [ˈlʌv; əv][ðə; ði] [plæt] [ˈrɪvər] .
more humid part of the State , south of the Platte River .
更多的 湿 部分 的 这 状态 , 南 的 这 普拉特 河 .

该州较为潮湿的地区, 位于普拉特河以南。

[ˌpərəʊˈmaɪskəs][ˌmænɪkjuːˈleɪtəs] - [ˈmɜːnz] .
Peromyscus maniculatus osgoodi Mearns .
鹿鼠 曼氏 - 米恩斯 .

Peromyscus maniculatus osgoodi Mearns.

[dɪr] [maʊs] . — - (- : -) [rɪˈpɔːrtɪd] [ðɪs] [ˈsʌbspɪːʃiːz] , [ˈʌndər][ðə; ði] [neɪm]
Deer Mouse . — Swenk (1908 : 95) reported this subspecies , under the name
鹿 老鼠 . — - (- : -) 据报道 这 亚种 , 在下面 这 姓名

[ˌpərəʊˈmaɪskəs] - , [frʌm; frəm] [glen] ,
Peromyscus nebrascensis , **from Glen** ,
鹿鼠 - , 从 格伦 ,

鹿鼠。——斯温克（1908：95）报道了该亚种, 并将其命名为内布拉斯加州鹿鼠（Peromyscus nebrascensis），发现于格伦。

[ænd; ənd][daɪs] (- : -) [rɪˈpɔːrtɪd] [ðə; ði] [ˈsʌbspɪːʃiːz] [frʌm; frəm] [ˈæɡət] ,
and Dice (1941 : 17) reported the subspecies from Agate ,
和 骰子 (- : -) 据报道 这 亚种 从 玛瑙 ,

Dice（1941：17）报道了来自阿加特的亚种,

[bəuθ][ləu'kælitiz] ['bi:ɪŋ] [ɪn] [su:] ['kaʊnti] [ɪn][ðə; ði] [ˌnɔ:rθ'westərn] [pɑ:rt][ʌv; əv][ðə; ði] [steɪt] .
both localities being in Sioux County in the northwestern part of the State .
两个都 地方 存在 在 苏族 县 在 这 西北 部分 的 这 状态 .
这两个地方都位于该州西北部的苏县。

[ˈɑ:s,gʊd] (-) , [haʊ'evər] ,
Osgood (1909) , however ,
奥斯古德 (-) , 然而 ,

然而，奥斯古德（1909 年）

[dɪd][nɑ:t][ˈmen](ə)n[nə'bræskən; ni-] ['spesimənz] [ʌv; əv] [ðɪs] ['sʌbspɪ:fɪ:z] [ænd; ənd][ɪk'sklu:dɪd; ek'sklu:dɪd]
did not mention Nebraskan specimens of this subspecies and excluded
做过 不是 提到 内布拉斯加州 标本 的 这 亚种 和 排除
[aɪ'ti:][frʌm; frəm][ðə; ði] [steɪt] [ɑ:n][hɪz; ɪz] ([ɑ:p] . [saɪt] .) [ˌdɪstrɪ'bju:](ə)n[mæp][ʌv; əv][ðə; ði] ['sʌbspɪ:fɪ:z]
it from the State on his (op . cit .) distribution map of the subspecies
它 从 这 状态 在 他的 (操作 . 引用 .) 分配 地图 的 这 亚种
[ʌv; əv][pi:] . [ˌmæniˌkju:'leɪtəs] .
of P . maniculatus .
的 P . 曼氏 .

在他的（同上）P. maniculatus 亚种分布图上，他没有提及内布拉斯加州的该亚种标本，也没有将该亚种排除在该州之外。

[ɪn] [ə'dɪ](ə)n , [ki:] (- : -) [rɪ'pɔ:rts] , [æz; əz][pi:] . [em] .
In addition , Quay (1948 : 181) reports , as P . m . nebrascensis ,
在 添加 , 码头 (- : -) 报告 , 作为 P . 米 .
此外，Quay（1948：181）报告称，P. m. nebrascensis，

[dɪr] [maɪs] [əb'teɪnd] [baɪ][hɪm; ɪm][ɪn][ðə; ði]['bædlændz][ʌv; əv] [ˈnɔ:rðərn] [su:] ['kaʊnti] [ænd; ənd]
deer mice obtained by him in the badlands of northern Sioux County and
鹿 小鼠 获得 经过 他 在 这 恶地 的 北方 苏族 县 和
[ə'dzeɪs(ə)nt][ˌnaɪə'brɑ:rə] ['kaʊnti] , [waɪ'oʊmɪŋ] .
adjacent Niobrara County , Wyoming .
邻近的 尼奥布拉拉 县 , 怀俄明州 .
他在怀俄明州苏县北部和邻近的尼奥布拉拉县的荒地中捕获了鹿鼠。

[fɔ:r] [dɪr] [maɪs][rɪ'fɜ:rəbl'refrəbl][tu:; tə][pi:] . [em] . [hæv; həv] [bɪn] [əb'teɪnd] [frʌm; frəm]
Four deer mice referable to P . m . osgoodi have been obtained from
四 鹿 小鼠 可参考的 到 P . 米 . - 有 到过 获得 从
['sevrəl] [ləu'kælitiz][ɑ:n][ðə; ði][paɪn] [rɪdʒ] [ɪn] [dɔ:z] ['kaʊnti] [æz; əz] ['fɑ:louz] :
several localities on the Pine Ridge in Dawes County as follows :
一些 地方 在 这 松树 岭 在 道斯 县 作为 跟随 :
从道斯县松岭的几个地点获得了四只可归类为 P. m. osgoodi 的鹿鼠，具体如下：

[θɹi:][mi:] . [i:][ʌv; əv] [ˈtjædrən] , [tu:'tu:]; [ˈtjædrən] [steɪt] [pɑ:rk] , [wʌn] ; [θɹi:][mi:] . [ɛs'dʌblju:][ʌv; əv]
3 mi . E of Chadron , 2 ; Chadron State Park , 1 ; 3 mi . SW of
3 米 . E 的 查德伦 , 2 ; 查德伦 状态 公园 , 1 ; 3 米 . 西南 的
['krɒfəd] , [wʌn] .
Crawford , 1 :
克劳福德 , 1 .
3 英里。 Chadron 的 E，2；查德伦州立公园，1； 3 英里。克劳福德西南，1。

[wen] [kəm'perd] [wɪð; wɪθ] ['spesimənz] [ʌv; əv][pi:] . [em] . [ˌdʒi:ə'græfɪkli] [ə'dzeɪs(ə)nt]
When compared with specimens of P . m . nebrascensis , geographically adjacent
什么时候 比较的 和 标本 的 P . 米 . - , 地理上 邻近的
[tu:; tə][ðə; ði] [i:st] ,
to the east ,
到 这 东方 ,
与地理位置在其东部相邻的内布拉斯加州 P. m. nebrascensis 标本相比，

[ðiːz] [maɪs][ɑːr; ər] [siːn] [tuː; tə][biː; bi][ˈnoʊtəbli][ˈdɑːrkər][ænd; ənd] [les] [ˈbʌfi] [ðæn; ðən]
these mice are seen to be notably darker and less buffy than
这些 小鼠 是 已见 到 是 尤其 较暗 和 较少的吸血鬼猎人巴菲 比
- [ænd; ənd][tuː; tə][ˈævərɪdʒ] [sɪɡˈnɪfɪkəntli] [ˈlɑːrdʒər][ɪn][bəʊθ][ɪkˈstɜːrn(ə)l][ænd; ənd][ˈkreɪniəl]
nebrascensis and to average significantly larger in both external and cranial
- 和 到 平均的 显著地 更大的 在 两个都 外部的 和 颅骨
[ˈmeɜrmənts] .
measurements .
测量 .

这些小鼠的毛色明显比内布拉斯加鼠深，黄色较少，而且体型（包括外部尺寸和颅骨尺寸）也明显更大。

[ɔːl] [dɪr] [maɪs][frʌm; frəm][ðə; ði][paɪn] [rɪdʒ] [ænd; ənd][əˈdʒeɪs(ə)nt][ˈbædlændz][ʌv; əv] [ɪkˈstriːm]
All deer mice from the Pine Ridge and adjacent badlands of extreme
全部 鹿 小鼠 从 这 松树 岭 和 邻近的 恶地 的 极端
[nɔːrθˈwestərn] [nəˈbræskə] [ˈprɑːbəbli][ɑːr; ər][best] [rɪˈfɜːrd] [tuː; tə][piː] . [em] . - .
northwestern Nebraska probably are best referred to P . m . osgoodi .
西北 内布拉斯加州 大概 是 最好的 指 到 P . 米 . - .

来自内布拉斯加州西北部松岭及其附近荒地的所有鹿鼠，可能最好归为 P. m. osgoodi。

[ɪkˈstɜːrn(ə)l] [ˈmeɜrmənts] [ʌv; əv] [tuː] [əˈdʌlt; ˈædʌlt] [ˈfiːmeɪl] [ɑːr; ər] [rɪˈspektɪvli] : [ˈtoʊt(ə)l][leŋkθ; leŋθ] ,
External measurements of two adult females are respectively : **Total length** ,
外部的 测量 的 二 成人 女性 是 分别 : 全部的 长度 ,
- , - ; [leŋkθ; leŋθ][ʌv; əv][teɪl] - [ˈvɜːrtɪbrə] ,
180 , 175 ; length of tail - vertebrae ,
- , - ; 长度 的 尾巴 - 椎骨 ,

两只成年雌性的外部测量数据分别为：全长，180，175；尾椎长度，

- , - ; [leŋkθ; leŋθ][ʌv; əv][haɪnd] [fʊt] , - , - ; [leŋkθ; leŋθ][ʌv; əv] [ɪr] , - , - .
78 , 74 ; length of hind foot , 19 , 20 ; length of ear , 17 , 16 :
- , - ; 长度 的 后 脚 , - , - ; 长度 的 耳朵 , - , - .
78、74；后足长度，19、20；耳朵长度，17、16。

[niːˈɑːtoʊmə][ˌflɔːrɪˈdæənə][kæmˈpestrɪs][dʒeɪ] . [ə; eɪ] . [ˈælən] .
Neotoma floridana campestris J . A . Allen .
新瘤 佛罗里达 野油菜 J . 一个 . 艾伦 .
佛罗里达新番茄 JA Allen。

[ˌflɔːrɪdə; ˈflɑːrədə] [wʊd] [ræt] . — [faɪv] [wʊd] [ræts][frʌm; frəm][faɪv][miː] . [en] , [tuːˈtuː][miː] . [ˈdʌbljuː][ʌv; əv]
Florida Wood Rat . — Five wood rats from 5 mi . N , 2 mi . W of
佛罗里达 木头 鼠 . — 五 木头 老鼠 从 5 米 . N , 2 米 . W 的
[ˈpɑːrks] ,
Parks ,
公园 ,

佛罗里达木鼠——在帕克斯以北 5 英里、以西 2 英里处发现了五只木鼠。

[ˈdʌndi] [ˈkaʊnti] , [ɪn] [ɪkˈstriːm] [ˌsaʊθˈwestərn] [nəˈbræskə] , [prəˈvaɪd][ðə; ði][fɜːrst][ˈrekɔːd; rɪˈkɔːd][ʌv; əv]
Dundy County , in extreme southwestern Nebraska , provide the first record of
邓迪 县 , 在 极端 西南 内布拉斯加州 , 提供 这 第一的 记录 的
[əˈkɜːrəns] [ʌv; əv] [ðɪs] [ˈsʌbspiːʃiːz] [ɪn][nəˈbræskə] .
occurrence of this subspecies in Nebraska .
发生 的 这 亚种 在 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州西南部的邓迪县首次记录到该亚种在内布拉斯加州的出现。

[ðiːz] [ˈænɪmlz] [wɜːr; wər] [træpt] [ɪn] [ˈaʊtlaɪn] [ˌfedz] [æt; ət][ðə; ði] [rɑːk] [kriːk] [stert] [fɪʃ] [ˈhætʃəri]
These animals were trapped in outlying sheds at the Rock Creek State Fish Hatchery
这些 动物 是 被困 在 边远 棚屋 在 这 岩石 溪 状态 鱼 孵化场
.
:
.

这些动物被困在罗克溪州立鱼类孵化场的外围棚子里。

[tuː] [lɑːrdʒ] [wʊd] - [ræt] [ˈhaʊzɪz] [wɜːr; wər][ɪn][ə; eɪ] [dens] [ˈθɪkɪt] [ʌv; əv] [brʌʃ] [ænd; ənd] [jʌŋ] [triːz]
[tuː] [lɑːrdʒ] [wʊd] - [ræt] [ˈhaʊzɪz] [wɜːr; wər] [ɪn] [ə; eɪ] [dens] [ˈθɪkɪt] [ʌv; əv] [brʌʃ] [ænd; ənd] [jʌŋ] [triːz]
二 大的 木头 - 鼠 房屋 是 在 一个 稠密 灌木丛 的 刷子 和 年轻的 树木
[ɪn][ə; eɪ][smɔːl] [drɔː] [ɑːn][ðə; ði][west] [sɑɪd][ʌv; əv][ðə; ði][moʊst] [ˈwestwərdli] [ˈhætʃəri] [leɪk] .
[ɪn] [ə; eɪ] [smɔːl] [drɔː] [ɑːn] [ðə; ði] [west] [sɑɪd] [ʌv; əv] [ðə; ði] [moʊst] [ˈwestwərdli] [ˈhætʃəri] [leɪk] .
在 一个 小的 画 在 这 西方 边 的 这 最多 向西 孵化场 湖 。

在最西边的孵化场湖泊西侧的一个小沟壑里，灌木丛和幼树丛中，有两个大型木鼠屋。

[braʊn] [ræts] ([ˈrætəs] [nɔːrˈvedʒɪkəs]) [ɪnˈhæbɪtɪd][ə; eɪ][kɑːmbɪˈneɪ][(ə)n] [gəˈrɑːʒ] - [stɔːrɪdʒ] [bɑːrn][æt; ət]
[braʊn] [ræts] ([ˈrætəs] [nɔːrˈvedʒɪkəs]) [ɪnˈhæbɪtɪd] [ə; eɪ] [kɑːmbɪˈneɪ] [(ə)n] [gəˈrɑːʒ] - [stɔːrɪdʒ] [bɑːrn] [æt; ət]
棕色的 老鼠 (鼠 挪威) 有人居住的 一个 组合 车库 - 贮存 谷仓 在
[ðə; ði] [ˈhætʃəri] [ænd; ənd][noʊ] [wʊd] [ræts][wɜːr; wər][ˈteɪkən][ðer; ðər] .
[ðə; ði] [ˈhætʃəri] [ænd; ənd] [noʊ] [wʊd] [ræts] [wɜːr; wər] [ˈteɪkən] [ðer; ðər] .
这 孵化场 和 不 木头 老鼠 是 已采取 那里 。

孵化场的车库兼储藏棚里住着褐家鼠（Rattus norvegicus），没有把林鼠带到那里。

[ˈmaɪkrətəs] [ˌpensəlˈvænɪkəs] [ˌpensəlˈvænɪkəs] ([ˈɔrd]) .
[ˈmaɪkrətəs] [ˌpensəlˈvænɪkəs] [ˌpensəlˈvænɪkəs] ([ˈɔrd]) .
田鼠 宾夕法尼亚 宾夕法尼亚 (奥德) 。

Microtus pennsylvanicus pennsylvanicus (Ord).

[ˌpenslˈveɪniə] [ˈmedoʊ] [maʊs] . — [ðɪs] [ˈsʌbspɪːʃiːz] [əˈkɜːrɪz] [ɪn] [ˈiːstərn] [ænd; ənd] [ˈsentərəl]
[ˌpenslˈveɪniə] [ˈmedoʊ] [maʊs] . — **[ðɪs] [ˈsʌbspɪːʃiːz] [əˈkɜːrɪz] [ɪn] [ˈiːstərn] [ænd; ənd] [ˈsentərəl]**
宾夕法尼亚州 草地 老鼠 . — 这 亚种 发生 在 东 和 中央
宾夕法尼亚草地鼠——该亚种分布于东部和中部地区。

[ˌpiːˈdʒiː] - [ˌpiːˈdʒiː]
[ˌpiːˈdʒiː] - [ˌpiːˈdʒiː]
[ˌpiːˈdʒiː] - [ˌpiːˈdʒiː]

[第486页]

[nəˈbræskə] ([siː] [ˈbeɪli] , - : - [ænd; ənd] - , - : -) .
[nəˈbræskə] ([siː] [ˈbeɪli] , - : - [ænd; ənd] - , - : -) .
内布拉斯加州 (看 贝利 , - : - 和 - , - : -) 。

内布拉斯加州（参见 Bailey，1900：18 和 Swenk，1908：104）。

[əˈdɪʃən(ə)l] [ˈrekərdz][ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] [ɑːr; ər][æz; əz] [ˈfɑːloʊz] : [fɑɪv][miː] . [iː][ʌv; əv] [ˈraɪzɪŋ] [ˈsɪti] ,
[əˈdɪʃən(ə)l] [ˈrekərdz] [ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] [ɑːr; ər] [æz; əz] [ˈfɑːloʊz] : [fɑɪv] [miː] . [iː][ʌv; əv] [ˈraɪzɪŋ] [ˈsɪti] ,
额外的 记录 的 发生 是 作为 跟随 : 5 米 . E 的 崛起 城市 ,
其他发生记录如下： 位于 Rising City 以东 5 英里处。

[ˈbʌtlər] [ˈkaʊnti] , [fɑɪv] ; [fɔːr][miː] . [es ˈiː][ʌv; əv] [ˈlɒːrəl] , [ˈsiːdər] [ˈkaʊnti] , [wʌn] ; [weɪn] , [tuːˈtuː] ,
[ˈbʌtlər] [ˈkaʊnti] , [fɑɪv] ; [fɔːr] [miː] . [es ˈiː][ʌv; əv] [ˈlɒːrəl] , [ˈsiːdər] [ˈkaʊnti] , [wʌn] ; [weɪn] , [tuːˈtuː] ,
巴特勒 县 , 5 ; 4 米 . 东南 的 劳雷尔 , 雪松 县 , 1 ; 韦恩 , 2 ,
巴特勒县，5；位于劳雷尔东南4英里处，锡达县，1；韦恩，2，

[ænd; ənd][tuːˈtuː] - [wʌn] / [tuːˈtuː][miː] . [iː][ʌv; əv] [weɪn] , [wʌn] , [weɪn] [ˈkaʊnti] ; [tuːˈtuː] - [wʌn] / [tuːˈtuː]
[ænd; ənd] [tuːˈtuː] - [wʌn] / [tuːˈtuː] [miː] . [iː][ʌv; əv] [weɪn] , [wʌn] , [weɪn] [ˈkaʊnti] ; [tuːˈtuː] - [wʌn] / [tuːˈtuː]
和 2 - 1 / 2 米 . E 的 韦恩 , 1 , 韦恩 县 ; 2 - 1 / 2
[miː] . [en][ʌv; əv][ˈɔrd] , [væli] [ˈkaʊnti] , [fɔːr] .
[miː] [en] [ʌv; əv] [ˈɔrd] , [væli] [ˈkaʊnti] , [fɔːr] .
米 . N 的 奥德 , 谷 县 , 4 .

位于韦恩县韦恩以东 2.5 英里处，1 英里；位于瓦利县奥德以北 2.5 英里处，4 英里。

- [kuːpəri] - ([kuːz]) .
[kuːpəri] - [kuːz] .
- [kuːpəri] - ([kuːz]) .
[kuːpəri] - [kuːz] .

Synaptomys cooperi gossii (Coues)。

[ˈkuːpər] [ˈlemɪŋ] [maʊs] . — [ˈfɪktɜː] [ænd; ənd][ˈhænsən] (- : [wʌn] - [eɪt]) [rɪˈpɔːrtɪd] [ðə; ði][fɜːrst]
Cooper Lemming Mouse . — Fichter and Hanson (1947 : 1 - 8) reported the first
库珀旅鼠 老鼠 . — 菲希特 和 汉森 (- : 1 - 8) 据报道 这 第一的
[noʊn] [əˈkɜːrəns] [ʌv; əv] [ðɪs] [ˈmaɪkrəˌtaɪn][ɪn] [nəˈbræskə] ,
known occurrence of this microtine in Nebraska ,
已知 发生 的 这 微针 在 内布拉斯加州 ,

库珀旅鼠——Fichter 和 Hanson (1947: 1-8) 报道了内布拉斯加州首次发现这种田鼠，

[rɪˈkɔːrdɪŋ] [ˈspesimənz] [frʌm; frəm] [ˈsevrəl] [ləuˈkælitɪz][ɪn][ˈlæŋkæstər] [ˈkaʊnti] [ænd; ənd][wʌn][frʌm; frəm]
recording specimens from several localities in Lancaster County and one from
记录 标本 从 一些 地方 在 兰开斯特 县 和 一 从
[nɪr] [ˈvæləntaɪn] , [ˈtʃeri] [ˈkaʊnti] .
near Valentine , Cherry County .
靠近 情人节 , 樱桃 县 .

记录了来自兰开斯特县几个地点的标本，以及来自樱桃县瓦伦丁附近的一个标本。

[ˈriːs(ə)nt][ˈrekərdz] [ʌv; əv] [ðɪs] [maʊs] [wɪtʃ] [help][tuː; tə][ˈklærəfaɪ][ɪts][ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n][ɪn] [nəˈbræskə] [ɑːr; ər]
Recent records of this mouse which help to clarify its distribution in Nebraska are
最近的 记录 的 这 老鼠 哪个 帮助 到 阐明 它是 分配 在 内布拉斯加州 是
[æz; əz] [ˈfɑːlouz] :
as follows :
作为 跟随 :

以下是近期有关这种老鼠的记录，有助于明确其在内布拉斯加州的分布情况：

[fɔːr][miː] . [en] , [wʌn] / [tuːˈtuː][miː] . [iː][ʌv; əv][ɑːkˈteɪviə] , [ˈbʌtlər] [ˈkaʊnti] , [wʌn] ; [faɪv][miː] . [en] ,
4 mi . N , 1 / 2 mi . E of Octavia , Butler County , 1 ; 5 mi . N ,
4 米 . N , 1 / 2 米 . E 的 奥克塔维娅 , 巴特勒 县 , 1 ; 5 米 . N ,
巴特勒县奥克塔维亚以北 4 英里，以东 0.5 英里；以北 5 英里，

[tuːˈtuː][miː] . [ˈdʌbljuː][ʌv; əv][ˈpɑːrks] , [ˈdʌndi] [ˈkaʊnti] , [wʌn] ; [wʌn][miː] . [en][ʌv; əv][ˈplez(ə)nt] [deɪl] ,
2 mi . W of Parks , Dundy County , 1 ; 1 mi . N of Pleasant Dale ,
2 米 . W 的 公园 , 邓迪 县 , 1 ; 1 米 . N 的 令人愉快的 戴尔 ,
[ˈsuːɜːd] [ˈkaʊnti] , [wʌn] .
Seward County , 1 :
西沃德 县 , 1 .

位于邓迪县帕克斯以西 2 英里处，1 英里；位于苏厄德县普莱森特戴尔以北 1 英里处，1 英里。

[æn; ən][əˈdʌlt; ˈædʌlt] [ˈfiːmeɪl] [frʌm; frəm] [ˈdʌndi] [ˈkaʊnti] [prəˈvaɪdz] [ðə; ði][ˈwestərnmooʊst][ˈrekoːd; rɪˈkoːd]
An adult female from Dundy County provides the westernmost record
一个 成人 女性 从 邓迪 县 提供 这 最西端 记录
[ʌv; əv][ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n][ʌv; əv][ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] [ɪn] [noːrθ] [əˈmerɪkə] .
of distribution of the species in North America .
的 分配 的 这 物种 在 北 美国 .

来自邓迪县的一只成年雌性个体提供了该物种在北美分布的最西端记录。

[ðə; ði][ˈænɪm(ə)l][wʌz; wəz] [træpt] [ɑːn][noʊˈvembər][wʌn] , - ,
The animal was trapped on November 1 , 1952 ,
这 动物 曾是 被困 在 十一月 1 , - ,
这只动物于1952年11月1日被捕获。

[ɪn][əˌsəʊsiˈeɪʃn; əˌsəʊʃiˈeɪʃn][wɪð; wɪθ][ˈmaɪkrətəs] [ˌpɛnsəlˈvæniːkəs] [moʊˈdestəs][ɪn][ə; eɪ] [ˈmɑːrʃi] [ˈeriə][æt; ət]
in association with Microtus pennsylvanicus modestus in a marshy area at
在 协会 和 田鼠 宾夕法尼亚 莫德斯图斯 在 一个 沼泽地 区域 在
[ðə; ði] [rɑːk] [kriːk] [stert] [fɪʃ] [ˈhætʃəri] [ɑːn] [sprɪŋ] - [fed] [rɑːk] [kriːk] .
the Rock Creek State Fish Hatchery on spring - fed Rock Creek .
这 岩石 溪 状态 鱼 孵化场 在 春天 - 美联储 岩石 溪 .

与 Microtus pennsylvanicus modestus 一起生活在 Rock Creek State Fish Hatchery 的 Rock Creek 泉水溪流的沼泽地区。

[ðə; ði] [ˈpelɪdʒ] [ɑːn][ðə; ði] [bæk] [ɪz][ˈnoʊtəbli][ˈdɑːrkər][ðæn; ðən][ɪn][es] . [siː] . - ,
The pelage on the back is notably darker than in S . c . gossii ,
这 毛皮 在 这 后退 是 尤其 较暗 比 在 S . c . - ,
背部的毛皮颜色明显比 S. c. gossii 深，

[ænd; ənd] [rɪ'zemblz] [es] . [si:] . [pæljədis][frʌm; frəm][ðə; ði]['simə,rəʊn]['rɪvər] ['dreɪnɪdʒ] [ɪn] ['mi:d]
and resembles S . c . paludis from the Cimarron River drainage in Meade
和 类似 S . c . 帕鲁迪斯 从 这 锡马龙 河 引流 在 米德
[ˈkaʊnti] , [ˈkænzəs] ,
County , Kansas ,
县 , 堪萨斯州 ,

并且与堪萨斯州米德县锡马龙河流域的沼泽拟深海金龟（S. c. paludis）相似。

[bʌt; bət][ɪn][ðə; ði][sʌm; səm][ˈtɒt(ə)] [ʌv; əv][ɪts] ['kærəktərz] [aɪ 'ti:] [moʊst] ['kloʊsli] [rɪ'zemblz] [es] . [si:] .
but in the sum total of its characters it most closely resembles S . c .
但 在 这 和 全部的 的 它是 人物 它 最多 密切 类似 S . c .
- [ə'mʌŋ] [neɪmd] ['sʌbspi:ʃi:z] .
gossii among named subspecies .
- 之中 命名 亚种 .

但就其所有特征而言，在已命名的亚种中，它与 S. c. gossii 最为相似。

[mə'sti:lə] - [kæm'pestris][ˈdʒæksən] .
Mustela rixosa campestris Jackson .
妙思乐 - 野油菜 杰克逊 .

黄鼬 (Mustela Rixosa Campestris Jackson)。

[li:st] ['wi:zl] . — [ðə; ði] [li:st] ['wi:zl] [ə'kɜ:rz] [ɪn] ['i:stərn] [ænd; ənd] ['sentrəl] [nə'bræskə] ([si:] -
Least Weasel . — The least weasel occurs in eastern and central Nebraska (see Swenk
至少 黄鼠狼 . — 这 至少 黄鼠狼 发生 在 东 和 中央 内布拉斯加州 (看 -
, - : - - - [ænd; ənd] [hɔ:l] , - :
, **1926 : 313 - 330 and Hall , 1951 :**
, - : - - - 和 大厅 , - - :

伶鼬——伶鼬分布于内布拉斯加州东部和中部（参见 Swenk，1926：313-330 和 Hall，1951:）。

-) [bʌt; bət][ɪz] [noʊn] [baɪ]['oʊnli][ə; eɪ]['sɪŋɡ(ə)] ['spesɪmən] [frʌm; frəm] [i:tʃ] [loʊ'kæləti] [ʌv; əv]
192) but is known by only a single specimen from each locality of
-) 但 是 已知 经过 仅有的 一个 单身的 标本 从 每个 地点 的
['rekɔ:d; rɪ'kɔ:d] [seɪv] [fɔ:r; fər][ðə; ði] ['eriə] [ə'raʊnd] ['ɪnlənd] ,
record save for the area around Inland ,
记录 节省 为了 这 区域 大约 内陆 ,

192) 但除内陆地区以外，每个有记录的地点都只有一份标本。

[kleɪ] ['kaʊnti] (- , [ɑ:p] . [sɪt] .) .
Clay County (Swenk , op . cit .) .
黏土 县 (- , 操作 . 引用 .) .

克莱县（Swenk，同上）。

[ə'dɪjən(ə)] ['rekərdz] [ʌv; əv][ðə; ði][dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n] [ʌv; əv] [ðɪs] ['mʌstɪlɪd] [ɪn] [nə'bræskə] [ɑ:r; ər] : ['heɪstɪŋz] ,
Additional records of the distribution of this mustelid in Nebraska are : Hastings ,
额外的 记录 的 这 分配 的 这 鼬科 在 内布拉斯加州 是 : 黑斯廷斯 ,
[ˈædəmz] ['kaʊnti] ,
Adams County ,
亚当斯 县 ,

关于这种鼬科动物在内布拉斯加州分布的其他记录有：黑斯廷斯、亚当斯县，

[wʌn] ([eɪtʃ 'em]) ; ['skailə] , ['koʊlfæks] ['kaʊnti] , [wʌn] (-) ;
1 (HM) ; Schuyler , Colfax County , 1 (NGFPC) ;
1 (HM) ; 斯凯勒 , 科尔法克斯 县 , 1 (-) ;

1 (HM); 斯凯勒, 科尔法克斯县, 1 (NGFPC);

['ɡoʊnə-] , ['su:ɜ-d] ['kaʊnti] , [wʌn] ([ɛn'ɛs'ɛm]) ; - [mi:] . [es] [ʌv; əv] ['vɔrd] , ['væli] ['kaʊnti] , [wʌn] (
Goehner , Seward County , 1 (NSM) ; 10 mi . S of Ord , Valley County , 1 (
戈纳 , 西沃德 县 , 1 (国家安全机制) ; - 米 . S 的 奥德 , 谷 县 , 1 (
-) .
NGFPC) .
-) .

戈纳, 苏厄德县, 1（NSM）; 奥德以南 10 英里, 瓦利县, 1（NGFPC）。

[ðə; ði][læst] ['men](ə)nd] ['spesɪməŋ] , [ə; eɪ] [skʌl] ['oʊnli] , [wʌz; wəz] [əb'teɪnd] [frʌm; frəm][ə; eɪ] ['pelɪt] [ʌv; əv]
The last mentioned specimen , a skull only , was obtained from a pellet of
这 最后的 提及 标本 , 一个 颅骨 仅有的 , 曾是 获得 从 一个 颗粒 的
[æŋ; ən][ˌʌnaɪ'dentɪfaɪd][ræp'tɔːriəl][bɜːrd] .
an unidentified raptorial bird .
一个 身份不明 猛禽 鸟 .
最后提到的标本, 只有一个头骨, 是从一只身份不明的猛禽的食丸中获得的。

[ˈlɪtərəʃʊr; ˈlɪtrətʃər; ˈlɪtrətʃʊr][ˈsɑːtɪd]
LITERATURE CITED
文学 引用

参考文献

[ˈberli] , [viː] . - .
Bailey , V . 1900 .
贝利 , V . - .

Bailey, V.1900。

[rɪˈvɪz(ə)n] [ʌv; əv] [ə'merɪkən] [voʊlz] [ʌv; əv][ðə; ði][ˈdʒiːnəs][ˈmaɪkrətəs] .
Revision of American voles of the genus Microtus .
修订 的 美国人 田鼠 的 这 属 田鼠 .
美洲田鼠属（Microtus）的修订。

[en] . [ˈeɪmɜː] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

[ˈfɔːnə] , - : [wʌn] - - , [dʒuːn][sɪks] .
Fauna , 17 : 1 - 88 , June 6 .
动物群 , - : 1 - - , 六月 6 .

动物志, 17: 1-88, 6月6日。

[ˈbɛrd] , [es] . [ef] . - .
Baird , S . F . 1858 .
贝尔德 , S . F . - .

Baird, SF1858。

[eksplə'reɪnɪz] [ænd; ənd][sɜː'veɪz, 'sɜː,veɪz][fɔːr; fər][ə; eɪ][ˈreɪlroʊd] [ruːt] [frʌm; frəm][ðə; ði] [ˌmɪsɪ'sɪpi] ['rɪvər]
Explorations and surveys for a railroad route from the Mississippi River
探索 和 调查 为了 一个 铁路 路线 从 这 密西西比州 河
[tuː; tə][ðə; ði][pə'sɪfɪk][ˈoʊ](ə)n] .
to the Pacific Ocean .
到 这 太平洋 海洋 .
从密西西比河到太平洋的铁路路线勘探和勘测。

[wɔːr] [dɪ'pɑːrtmənt] .
War Department .
战争 部门 .

战争部。

[eɪt] (['mæm(ə)lz] , [pɑːrt][wʌn]) : [ˌɛks'ɛks'tuː] + - , [dʒʊˈlaɪ] - .
8 (Mammals , Part 1) : xxxii + 757 , July 14 .
8 (哺乳动物 , 部分 1) : xxxii + - , 七月 - .
8（哺乳动物, 第1部分）: xxxii + 757, 7月14日。

[biːd] , [ˈdʌbljuː] . [iː] . - .
Beed , W . E . 1936 .
比德 , W . E . - .

比德, WE1936。

[ə; eɪ] [prɪˈlɪmɪneri] ['stʌdi] [ʌv; əv][ðə; ði][ˈænɪm(ə)l][iˈkɑːlədʒi][ʌv; əv][ðə; ði][ˌnaɪəˈbrɑːrə] [geɪm] [prɪˈzɜːrv] .
A preliminary study of the animal ecology of the Niobrara Game Preserve .
一个 初步的 学习 的 这 动物 生态 的 这 尼奥布拉拉 游戏 保存 .

尼奥布拉拉野生动物保护区动物生态学初步研究。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .
公牛。

[kənˈsɜːv] .
Conserv .
保护 .
保护。

[dept] . , [kənˈsɜːv] .
Dept . , **Conserv** .
部门 . , 保护 .
保护部

[sɜːrv] .
Surv .
生存 .
调查。

[dɪv] . , [ˈjuːnəv] .
Div . , **Univ** .
div . , 大学 .
大学

[nəˈbræskə] , - : [wʌn] - - , [ɑːkˈtoʊbər] .
Nebraska , **10** : **1** - **33** , **October** .
内布拉斯加州 , - : 1 - - , 十月 .
内布拉斯加州，10：1-33，10 月。

[,piː ˈdʒiː -]
[**Pg** **487**]
[页 -]
[第 487 页]

['kɑːkrəm] , [iː] . [el] . - .
Cockrum , **E** . **L** . **1951** .
考克伦 , E . L . - .
Cockrum，EL1951。

[ə; eɪ] [nuː] ['pɑːkɪt] [maʊs] (['dʒiːnəs] [ˌperəʊˈnɑːθəs]) [frʌm; frəm][ˈkænzəs] .
A new pocket mouse (genus Perognathus) from Kansas .
一个 新的 口袋 老鼠 (属 佩罗格纳图斯) 从 堪萨斯州 .
堪萨斯州发现一种新的袋鼠（Perognathus属）。

[ˈjuːnəv] .
Univ .
大学 .
大学

[ˈkænzəs] [pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , **Mus** .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .
堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .
国家。

[hɪst] . , [faɪv] : - - - , [drɪˈsembər] - .
Hist , **5** : **203** - **206** , **December 15** .
历史 : , 5 : - - - , 十二月 - .

历史, 5: 203-206, 12月15日。

[daɪs] , [el] . [ɑːr] . - .
Dice , **L** : **R** : **1941** .
骰子 , L : 拉 : - - .

骰子, LR1941。

[ˌveriˈeɪ(ə)n][ˌʌv; əv][ðə; ði] [dɪr] [maɪs] ([ˌpɛrəʊˈmaɪskəs][ˌmænɪkjuːˈleɪtəs]) [ɑːn][ðə; ði][sænd] [hɪlz] [ˌʌv; əv]
Variation of the deer mice (Peromyscus maniculatus) on the sand hills of
变化 的 这 鹿 小鼠 (鹿鼠 曼氏) 在 这 沙 丘陵 的
[nəˈbræskə][ænd; ənd][əˈdʒeɪs(ə)nt] ['eriəz] .
Nebraska and adjacent areas .
内布拉斯加州 和 邻近的 区域 .

内布拉斯加州沙丘及邻近地区鹿鼠（Peromyscus maniculatus）的变种。

[kənˈtrɪb] .
Contrib .
贡献 .

贡献。

[ˈjuːnəv] .
Univ :
大学 .

大学

[ˈmɪʃɪɡən] [læb] .
Michigan Lab .
密歇根州 实验室 .

密歇根实验室。

[vɜːrt] .
Vert .
垂直 .

垂直。

[dʒəˈnetɪks] , - : [wʌn] - - , [dʒʊˈlaɪ] .
Genetics , **15** : **1** - **19** , **July** .
遗传学 , - : 1 - - , 七月 .

遗传学, 15: 1-19, 7月。

[ˈfɪktɜː] , [iː] . [eɪtʃ] . , [ænd; ənd][em] . [ef] . [ˈhænsən] . - .
Fichter , **E** : **H** : , **and** **M** : **F** : **Hanson** : **1947** .
菲希特 , E : H : , 和 M : F : 汉森 : - .

Fichter, EH 和 MF Hanson.1947。

[ðə; ði] [ɡɑːs] ['lemɪŋ] [maʊs] , - ['kuːpəri] - ([kuːz]) , [ɪn][nəˈbræskə] .
The Goss lemming mouse , **Synaptomys cooperi gossii** (**Coues**) , **in Nebraska** .
这 戈斯 旅鼠 老鼠 , - 库珀里 - (库斯) , 在 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的戈斯旅鼠，学名 Synaptomys cooperi gossii (Coues)。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .

公牛。

[ˈjuːnəv] .
Univ :
大学 .

大学

[nəˈbræskə] [stɛɪt] [mʌs] . , [θɪɹiː]ː [wʌn] - [eɪt] , [sepˈtɛmbər] .
Nebraska State Mus . , **3**ː **1** - **8** , **September** .
内布拉斯加州 状态 音乐 . , 3ː 1 - 8 , 九月 .

内布拉斯加州立博物馆，3：1-8，9 月。

[glæs] , [biː] . [piː] . - .
Glass , **B** . **P** . **1947** .
玻璃 , B . P . - .

玻璃，BP1947。

[ˌdʒiːəˈɡræfɪk] [ˌvɛrɪˈeɪ(ə)n][ɪn] [ˌpɛroʊˈnɑːθəs] [ˈhɪspɪdəs] .
Geographic variation in Perognathus hispidus .
地理 变化 在 佩罗格纳图斯 粗毛 .

Perognathus hispidus 的地理变异。

[ˈdʒuːr] . [ˈmæm] . , -ː - - - , [dʒuːn][wʌn] .
Jour . **Mamm** . , **28**ː **174** - **179** , **June** **1** .
一天 . 乳房 . , -ː - - - , 六月 1 .

日记。妈妈，28：174-179，6 月 1 日。

[hɔːl] , [iː] . [ɑːr] . - .
Hall , **E** . **R** . **1951** .
大厅 , E . 拉 . - .

Hall，ER1951。

[əˈmɛrɪkən] [ˈwiːzəlz] .
American weasels .
美国人 黄鼠狼 .

美洲鼬。

[ˈjuːnəv] .
Univ .
大学 .

大学

[ˈkænzəs] [pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , **Mus** .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .

堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [fɔːr]ː [wʌn] - - - , [dɪˈsembər] - .
Hist . , **4**ː **1** - **466** , **December** **27** .
历史 . , 4ː 1 - - - , 十二月 - .

历史，4：1-466，12月27日。

[ˈhaʊəl] , [ə; eɪ] . [ɛrtʃ] . - .
Howell , **A** . **H** . **1938** .
豪厄尔 , 一个 . H . - .

Howell，AH1938。

[rɪˈvɪʒ(ə)n] [ʌv; əv] [nɔːrθ] [əˈmɛrɪkən] [ɡraʊnd] [ˈskwɪrəlz] [wɪð; wɪθ][ə; eɪ][ˌklæsɪfɪˈkeɪ(ə)n][ʌv; əv][ðə; ði] [nɔːrθ]
Revision of North American ground squirrels with a classification of the North
修订 的 北 美国人 地面 松鼠 和 一个 分类 的 这 北

[əˈmɛrɪkən] [saɪˈʃʊərɪdiː] .
American Sciuridae .
美国人 松鼠科 .

对北美地松鼠进行修订，并对北美松鼠科进行分类。

[en] . [ˈeɪmɜː] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

[ˈfɔːnə] , - : [wʌn] - - , [meɪ] - .
Fauna , 56 : 1 - 256 , May 18 .
动物群 , - : 1 - - , 可能 - .

动物志，56：1-256，5月18日。

[ˈdʒæksən] , [ertʃ] . [ertʃ] . [tiː] . - .
Jackson , H . H . T . 1928 .
杰克逊 , H . H . T . - .

杰克逊，HHT1928。

[ə; eɪ][ˌtæksəˈnɑːmɪk] [rɪˈvjuː] [ʌv; əv][ðə; ði][əˈmerɪkən] [lɔːŋ] - [teɪld] [[ruː] .
A taxonomic review of the American long - tailed shrews .
一个 分类学 审查 的 这 美国人 长的 - 有尾巴的 鼯鼠 .

美洲长尾鼯的分类学研究。

[en] . [ˈeɪmɜː] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

[ˈfɔːnə] , - : [ˈvaɪ, ˈviː] + - , [dʒʊˈlaɪ] - .
Fauna , 51 : vi + 228 , July 24 .
动物群 , - : 六 + - , 七月 - .

Fauna，51：vi + 228，7月24日。

[dʒəʊnz] , [dʒeɪ] . [keɪ] . [ˈdʒʊnjɜː] . , [ænd; ənd][oʊ] . [el] . [web] . - .
Jones , J . K . Jr . , and O . L . Webb . 1949 .
琼斯 , J . K . 小 . , 和 哦 . L . 韦伯 . - .

Jones, JK Jr. 和 OL Webb.1949。

[noʊts] [ɑːn] [ˈmæm(ə)lɪz] [frʌm; frəm] [ˈrɪtʃərdzən] [ˈkaʊnti] , [nəˈbræskə] .
Notes on mammals from Richardson County , Nebraska .
笔记 在 哺乳动物 从 理查森 县 , 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州理查森县哺乳动物记录。

[ˈdʒuːr] . [ˈmæm] . , - : - - - , [ˈɔːɡəst] - .
Jour . Mamm . , 30 : 312 - 313 , August 17 .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 八月 - .

日记。妈妈，30：312-313，8月17日。

[ˈɑːsɡʊd] , [ˈdʌbljuː] . [ertʃ] . - .
Osgood , W . H . 1904 .
奥斯古德 , W . H . - .

奥斯古德，WH1904。

[tuː] [nuː] [ˈpɑːkɪt] [maɪs][ʌv; əv][ðə; ði][ˈdʒiːnəs] [ˌperəʊˈnɑːθəs] .
Two new pocket mice of the genus Perognathus .
二 新的 口袋 小鼠 的 这 属 佩罗格纳图斯 .

两种新的袋鼠属（Perognathus）小鼠。

[pˈrɒk] .
Proc .
过程 .

程序。

[ˈbaɪəl] .
Biol .
生物学 .

生物学

[ˌes oʊ ˈsiː] .

Soc .
社会 .

社会学

[ˈwɑːʃɪŋtən] , - : - - - , [dʒuːn][naɪn] . - .
Washington , **17** : **127** - **128** , **June** **9** . **1909** .
华盛顿 , - : - - - , 六月 9 . - .

华盛顿, 17: 127-128, 1909 年 6 月 9 日。

[rɪˈvɪʒ(ə)n] [ʌv; əv][ðə; ði][maɪs] [ʌv; əv][ðə; ði] [əˈmerɪkən] [ˈdʒiːnəs][ˌperəʊˈmaɪskəs] .
Revision **of** **the** **mice** **of** **the** **American** **genus** **Peromyscus** .
修订 的 这 小鼠 的 这 美国人 属 鹿鼠 .

美洲鹿鼠属（Peromyscus）小鼠的修订。

[en] . [ˈeɪmṣə] .
N . **Amer** .
N . 美国 .

北美

[ˈfɔːnə] , - : [wʌn] - - , [ˈeɪprəl] - .
Fauna , **28** : **1** - **285** , **April** **17** .
动物群 , - : 1 - - , 四月 - .

动物志, 28: 1-285, 4月17日。

[kiː] , [ˈdʌbljuː] . [biː] . - .
Quay , **W** . **B** . **1948** .
码头 , W . B . - .

码头, WB1948。

[noʊts] [ɑːn][sʌm; səm][bəts][frʌm; frəm] [nəˈbræskə] [ænd; ənd][waɪˈoʊmɪŋ] .
Notes **on** **some** **bats** **from** **Nebraska** **and** **Wyoming** .
笔记 在 一些 蝙蝠 从 内布拉斯加州 和 怀俄明州 .

关于内布拉斯加州和怀俄明州一些蝙蝠的记录。

[ˈdʒuːr] . [ˈmæm] . , - : - - - , [meɪ] - .
Jour . **Mamm** . , **29** : **181** - **182** , **May** **14** .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 可能 - .

日记。妈妈, 29: 181-182, 5 月 14 日。

[ˈrɪdʒweɪ] , [ɑːr] . - .
Ridgway , **R** . **1912** .
里奇韦 , 拉 . - .

里奇韦, R.1912。

[ˈkʌlər] [ˈstændərdz][ænd; ənd][ˈkʌlər][nəˈmenklətʃərˈnoʊmənkleɪtʃər] .
Color **standards** **and** **color** **nomenclature** .
颜色 标准 和 颜色 命名法 .

颜色标准和颜色命名法。

[ˈwɑːʃɪŋtən] , [diː] . [siː] . [ˈpraɪvətli] [ˈprɪntɪd] , [aɪ ˈviː] + - , - [piːɛlˈes] .
Washington , **D** . **C** . **Privately** **printed** , **iv** + **44** , **53** **pls** .
华盛顿 , D . C . 私下 打印 , 四 + - , - 请 .

华盛顿特区 私人印刷, iv + 44, 53 幅。

- , [em] . [eɪtʃ] . - .
Swenk , **M** . **H** . **1908** .
- , M . H . - .

斯文克, MH1908。

[ə; eɪ] [prɪˈlɪmɪneri] [rɪˈvjuː] [ʌv; əv][ðə; ði] [ˈmæm(ə)lz] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] .
A **preliminary** **review** **of** **the** **mammals** **of** **Nebraska** .
一个 初步的 审查 的 这 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州哺乳动物的初步研究。

[p'ɒk] .
Proc .
过程 .

程序。

[nə'bræskə][ˈeɪ,kæd] .
Nebraska Acad .
内布拉斯加州 学院 .

内布拉斯加学院

[ˈsiː, ˈɛsˈsiːˈaɪ] . , [ɛrt] : - - - . - .
Sci . , , **8** : **61** - **144** . **1926** .
科学 . , , 8 : - - - . - - .

科学，8：61-144.1926。

[noʊts] [ɑːn] [mʌstɛk] [kæmˈpestris][ˈdʒæksən] , [ænd; ənd][ɑːn][ðə; ði] [əˈmerɪkən] [fɔːrmz][ʌv; əv] [liːst] ['wiːzəlz]
Notes on Mustek campestris Jackson , and on the American forms of least weasels
笔记 在 穆斯泰克 野油菜 杰克逊 , 和 在 这 美国人 表格 的 至少 黄鼠狼
.
.
.

关于野鼬属动物杰克逊种和美洲小鼬的笔记。

[ˈdʒuːr] . [ˈmæm] . , [ˈseɪvən] : - - - , [noʊˈvembər] - .
Jour . **Mamm** . , , **7** : **313** - **330** , **November 23** .
一天 . 乳房 . , , 7 : - - - , 十一月 - .

日记。Mamm., 7：313-330，11 月 23 日。

[web] , [oʊ] . [el] . , [ænd; ənd][dʒeɪ] . [keɪ] . [dʒəʊnz] , [ˈdʒʊnjə] . - .
Webb , **O** . **L** . , , **and** **J** . **K** . **Jones** , **Jr** . **1952** .
韦伯 , 哦 . L . , , 和 J . K . 琼斯 , 小 . - .

韦伯，OL，和 JK 琼斯，Jr.1952。

[æn; ən] ['ænətetɪd] ['tʃeklɪst] [ʌv; əv][nə'bræskən; ni-][bæts] .
An annotated checklist of Nebraskan bats .
一个 带注释的 检查清单 的 内布拉斯加州 蝙蝠 .

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）。

[ˈjuːnəv] .
Univ .
大学 .

大学

[ˈkænzəs][pʌbl] . , [mʌs] .
Kansas Publ . , **Mus** .
堪萨斯州 出版 . , 音乐 .

堪萨斯州出版社，博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [faɪv] : - - - - , [meɪ] - .
Hist . , , **5** : **269** - **279** , **May 31** .
历史 . , , 5 : - - - - , 可能 - .

历史，5：269-279，5月31日。

[trænzˈmɪtɪd] ['dʒænjueɪ] - , - . - - - -
Transmitted January 11 , 1954 . 25 - 2530
传输 一月 - , - . - - - -

1954年1月11日播出。25-2530

听书破万卷

开口如有神

